CAVEX Bite&White PATIENT TOOTH WHITENING INSTRUCTIONS

Quick Reference Chart



	1	2	3	4	5	6
NL	Poets het gebit grondig	Breek het dopje van de spuitfl.	Dosseer 1 druppel per tand in de lepel	Breng de bleekgel aan in de mond		
DE	Das Gebiss gründlich putzen	Die Spitze der Dosierspritze abbrechen	Pro Zahn 1 Tropfen in den Löffel geben	Den Bleichöffel im Mund anbringen		
FR	Lavez-vous soigneusement les dents	Casser l'embout à l'extrémité de la seringue	Verser 1 goutte par dent dans la gouttière	Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche		
GB	Brush your teeth thoroughly	Break the cap off the nozzle	Administer 1 drop per tooth into the tray	Insert the bleaching tray into your mouth		
IT	Lavarsi bene i denti	Rompere il cappuccio della siringa	Mettere 1 goccia di prodotto per ogni cavità dentale della mascherina	Inserire la mascherina sulla apposita arcata		
ES	Cepillese los dientes a fondo	Romper el tapón de la punta dispensadora	Dosifique 1 gota por diente en la cubeta	Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca		
HR	Temeljito operite zube	Odlomite vrh štrcaljke	Nanesite 1 kap po zubu na udubljenje	Umetnite udubljenje sa sredstvom za izbjeljivanje u usta		
DK	Børst tænderne grundigt	Brækhætten af sprøjesidsden	Dryp en dråbe pr. tand i skeen	Sæt blegeskeen på tænderne		
HU	Mossa meg alaposan a fogát	Törje le a fecskendőtubus kupakját	Tegyen fogánként egy cseppet a tálcába	Helyezze a fehérítőtálcát a szájába		
PL	Zęby należy dokładnie umyć	Należy odłamać nakrętkę ze strzykwy	Dozować 1 kroplę na ząb do łyżeczki	Wprowadź łyżeczkę wybieleniową do jamy ustnej		
PT	Escove muito bem os dentes	Quebre a tampinha do bico aplicador	Aplique 1 gota por dente no molde	Introduza o molde de branqueamento na boca		
S	Borsta tänderna noga	Bryt av hatten från sprutspetsen	Droppa 1 droppe per tand i skeden	För blekningsskenan mot munnen		
TR	Dişlerinizi iyice fırçalayın	Tüpün uçunu çıkatarak tüpün açılmasını sağlayın	Her diş için dağ kalıbına birer damla Çavex Bite damlatın	Dış kalıbını ağzınızın içerisine yerleştirin.		
GR	Βουρτσίστε πολύ καλά τα δόντια	Σπάστε το πώμα του σιρουζιού	Βάλτε στο δοκάρακι μία δόση που αντιστοιχεί σε 1 επιχείνιο ανά δόντι	Βάλτε το δοκάρακι λεύκανσης στο στόμα		
RUS	Тщательно почистите зубы	Отломите наконечник аппликатора	Нанесите по 1 капле на каждый отпечаток зуба в капе	Наденьте капу для отбеливания на зубы		
CN	将牙齿彻底刷一遍	打破注射器头端的小帽	在酒杯里倒为每一颗牙齿注入一滴增白剂	将酒杯置放入口腔		
KOR	치아를 구석구석 잘 닦으십시오	튜브의 끝부분을 잘라낸다.	튜브의 팁을 이용하여 각 치아에 1방울씩 미백제를 투여한다.	미백트레이를 입에 끼운다.		
SA	نظف أسنانك جيداً بالفرشة	اكسر غطاء قوهة البلي	ضع مقدار قطرة واحدة لكل سن على الملعقة	ضع حافظة خزان اللون فوق الفم		

	5	6	7	8
NL	Bleek gedurende minimaal 1 uur	Spoel de mond met water	Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden	Reinig de bleekelpels met uw tandborstel
DE	Mindestens 1 Stunde bleichen	Den Mund mit Wasser ausspülen	Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen	Die Bleichöffel mit der Zahnbürste reinigen
FR	Laissez agir pendant au moins 1 heure	Rincez-vous la bouche à l'eau	Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement	Nettoyez les gouttières de blanchiment avec votre brosse à dents
GB	Bleach for at least one hour	Rinse your mouth with water	Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully	Clean the bleaching tray with your toothbrush
IT	Lasciare agire per almeno 1 ora	Risciacquare la bocca con acqua	Attendere almeno mezzora e lavarsi i denti con delicatezza	Pulire le mascherine con lo spazzolino da denti
ES	Blanquee los dientes al menos durante 1 hora	Enjuague la boca con agua	Espere al menos 0,5 hora y cepille los dientes suavemente	Limpie las cubetas de blanqueamiento con el cepillo de dientes
HR	Tretajte najmanje jedan sat	Isperite usta vodom	Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube	Očistite udubuje vašom četkicom za zube
DK	Bleg i minimum 1 time	Skyl munden med vand	Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt	Rengør bleknigsskenerne med tandbørsten
HU	Legalább 1 órára fehérítse a fogát	Öblítse ki a szását vízzel	Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mossa meg a fogát	Tisztítsa ki a tálcát a fogkefével
PL	Zęby należy wybielać przez przynajmniej 1 godzinę	Spłukać jamę ustną wodą	Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby	Łyżeczki do bielenia należy umyć szczoteczką do zębów
PT	O tempo de embranqueçimento deve ser no mínimo 1 hora	Enxague a boca com água	Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes	Limpe os moldes de branqueamento com a sua escova de dentes
S	Blek tänderna under minst 1 timme	Skölj munnen med vatten	Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt	Rengör blekningsskenorna med tandborsten
TR	Diş beyazlatma işlemini en az bir saat sürdürün	Ağzınızı su ile çalkalayın	En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice diş fırçası kullanın	Diş fırçası yardımıyla dış kalıplarını temizleyin
GR	Λευκάνετε επί 1 ώρα τουλάχιστον	Ξεπλύνετε τη στόμα με νερό	Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βουρτσίστε επειτα προσεχτικά τα δόντια	Νο καθαρίζετε τα δοκαράκι λεύκανσης με την οδοντόβουρτσά σας
RUS	Процедуру отбеливания продолжать не менее получаса	Прополощите рот водой	По истечении не менее получаса осторожно почистите зубы	Очистите капу для отбеливания зубной щеткой
CN	持续漂白至少 1 小时	用水漱口	等候至少半小时，然后小心地刷牙	用牙刷清洗漂白牙套
KOR	미백이 진행되기까지 적어도 1시간 이상 기다리세요	물로 입을 헹군다.	30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 한다.	칫솔로 미백트레이를 깨끗이 닦는다.
SA	اترك اللون لمدة لا تقل عن ساعة	اشطف الفم بالماء	انتظر نصف ساعة على الأقل ثم نظف أسنانك بحرص بالفرشة	نظف حافظة خزان اللون بفرشة أسنانك

NL Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING
Waterstofperoxide dient als bleekmiddel in Cavex Bite&White. Het wordt toegevoegd als carbamideperoxide om een voldoende stabiel product te verkrijgen. De carbamideperoxide zal dan ook ook in gezuurstofradicalen en water. Tijdens het bleekproces vallen de vrije radicalen de dubbele koolstofverbindingen aan; deze vormen meestal de bron van tandverkleuring.

VERPAKKING
▶ Cavex Bite&White spuiten (3 ml)

ZAMENSTELLING
Actieve bestanddelen:
- 16 % carbamideperoxide – gelijk aan
  - 6 % waterstofperoxide
- 0,2 % kaliumnitraat-Desensitizer
- 0,1 % natriumfluoride-desensitizer

INDICATIES VOOR GEBRUIK
Cavex Bite&White is een whitening product om de kleur van natuurlijke tanden lichter te maken. Cavex Bite&White dient uitsluitend voor gebruik door of opdracht van een tandheelkundige worden verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Een consult bij een bevoegde tandarts vóór elke bleekbehandeling wordt aanbevolen om mondof gezondheidsproblemen uit te sluiten.

CONTRA-INDICATIES
Onderstaande personen wordt geadviseerd voorafgaand aan de behandeling een arts te raadplegen:
- Zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven.
- Personen die worden behandeld voor een ernstige ziekte.

KLINISCHE PROCEDURE
- Leg de uitgangskleur vast, evalueer de huidige gezondheid van het gebit en zorg er voor dat de verwachtingen van de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisorische of tijdelijke gebitsreparaties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composiet- of polycarbonaat materiaal niet wordt beïnvloed. Daarom dient aan patiënten met composietrestauraties te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden witter worden.
- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben, 2 weken na de laatste behandeling; de lijm kan dan zich dan stabiliseren. Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed gesteld met de juiste tijdelijke materialen.
- Het gebruik van een product tegen gevoelige tanden, 2 weken voor de behandeling tot 2 weken daarna, dient te worden aanbevolen.
- U dient de patiënt altijd te waarschuwen voor gevoeligheid van de tanden of gelmteerd tandwees tijdens de behandeling. Het tandweefsel dat met het middel in aanraking kwam, kan rood of wit worden, maar neemt na enkele dagen de normale kleur weer aan.
- Adviseer de patiënt - om irritatie van zacht weefsel te voorkomen - om de tray niet te overvullen, dit zal tevens zorgen dat de gel niet in contact komt met de tandvlees, om de mond na de behandeling grondig te spoelen.
- Wijs de patiënt er op dat het tijdens de eerste dagen na elke behandeling weer op de spuit moet worden gepleitst.
- De patiënt mag minstens 60 minuten na elke behandeling niet eten, drinken of roken.
- Instrueer de patiënt om de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact met u op te nemen als zich een problem voordoet.
- De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin van de behandeling tot stand.

WAARSCHUWINGEN
- Bevat fluoride.
- Bevat waterstofperoxide.
- Vermijd contact met de ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de gevulde op maat gemaakte trays.
- Gevaarlijk bij inslikken.

INSTRUCTIES VOOR EERSTE HULP
- Als een goed deel van de spuit (3 ml) om de gel in de spuit is ingeslikt: onmiddellijk water drinken, braken niet opwekken en een arts raadplegen.
- Indien er gel in de ogen komt: ogen onmiddellijk spoelen met water.
- Bij contact met kleding, huid of haar: aangetaste kleding verwijderen en huid of haar onder een lopende kraan spoelen.

MOGELIJKE NADELIGE EFFECTEN
Nadelige effecten die kunnen voorkomen bij het gebruik van Cavex Bite&White zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

Gevoeligheid
Sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling een toegenomen gevoeligheid van de tanden voor kou ervaren; anderen kunnen een niet-specifieke gevoeligheid ervaren in tanden, tandvlees, tong, lippen of keel. In het algemeen dienen de symptomen enkele dagen na beëindiging van de behandeling te verdwijnen. De behandeling kan worden voortgezet, mits minder frequente applicaties toestel het gewenste bleekeffect is bereikt. Als het ongemak blijft, dient de behandeling te worden beëindigd.

Irritatie van het tandvlees
Trays die zich uitstrekken tot het tandvlees, kunnen een matige tot ernstige irritatie van zacht weefsel veroorzaken.
Indien de trays goed passen, controleer dan of de patiënt de correcte hoeveelheid op de juiste manier verwerkt.
Wellicht dient de patiënt de hoeveelheid gel in de trays te verminderen.

BEWAARADVIES
- Bewaar in de koelkast (+8°C) op een donkere, droge plek.
- Gebruik het materiaal niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

VERWUDERING
- Verwijder het product conform de lokale afvalregels.

D Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG
Cavex Bite&White enthält das Bleichmittel Wasserstoffperoxid. Um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten, wird dieses als Carbamidperoxid zugesetzt. Carbamidperoxid zerfällt schnell in Sauerstoffradikale Teilchen und Wasser. Beim Bleichen spalten sich die freien radikalen Kohlenstoffverbindungen mit Doppelbindungen, die ist häufig die Ursache von Zahnverfärbungen.

VERPACKUNG
▶ Cavex Bite&White Spritzen (3 ml)

ZUSAMMENSETZUNG
Wirkstoffe:
- 16 % Carbamidperoxid – entspricht
  - 6 % Wasserstoffperoxid
- 0,2 % Kaliumnitrat-Desensitizer
- 0,1 % Natriumfluorid-Desensitizer

INDIKATIONEN
Cavex Bite&White ist ein Bleichprodukt zum Aufhellen der Farbe natürlicher Zähne. Cavex Bite&White darf ausschließlich von Zahnmedizinern oder deren Auftrag und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Um Mund- und Gesundheitsbeschwerden auszuschließen, empfiehlt es sich, vor jeder Bleichbehandlung einen qualifizierten Zahnarzt zu konsultieren.

GEGENINDIKATIONEN
Den nachstehenden Personen wird empfohlen, vor der Behandlung einen Arzt zu konsultieren:
- Schwangeren und stillenden Frauen.
- Personen die aufgrund einer schweren Krankheit behandelt werden.

KLINISCHES VERFAHREN
- Bestimmen Sie die Ausgangsfarbe, ermitteln Sie den Gesundheitszustand des Gebisses und sorgen Sie dafür, dass der Patient eine realistische Vorstellung vom Endergebnis erhält.
- Die provisorischen Gebissrestaurationen kann es während des Aufhellungsprozesses zu Verfärbungen kommen.
  Bei Kompositi- oder Polycarbonatmaterial tritt dieser Effekt nicht auf. Patienten mit Kompositrestaurationen sind daher darüber zu informieren, dass diese eventuell ersetzt werden müssen, da nur die natürlichen Zähne weißer werden.
- Bei Patienten, die eine ästhetische oder adhesive Restauration benötigen, empfiehlt es sich, nach der letzten Bleaching-Behandlung 2 Wochen zu warten. Die Farbe kann sich dann stabilisieren. Sämtliche Restaurationen müssen intakt oder mit geeigneten provisorischen Materialien versiegelt sein.
- It convient de recommander d'utiliser un produit pour dents sensibles 2 semaines avant le traitement et jusqu'à 2 semaines après.
- Machen Sie den Patienten darauf aufmerksam, dass es während der Behandlung zu einer Übermempfindlichkeit der Zähne oder zu Reizungen am Zahnfleisch kommen kann. Wenn das Zahnfleisch mit dem Mittel in Berührung kommt, kann es sich rot oder weiß färben. Nach einigen Tagen nimmt es wieder seine normale Farbe an.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass die Schiene nicht zu voll gemacht werden darf, dass Gel nicht das Zahnfleisch berührt und dass der Mund nach der Behandlung gründlich gespült wird.
- Die Patienten sollten mindestens 60 Minuten nach jeder Behandlung nicht essen, trinken oder rauchen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass die Spritze nach jeder Behandlung wieder zu verschließen ist.
  Nach jeder Behandlung darf der Patient 60 Minuten lang nichts essen und trinken und nicht rauchen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass bei Problemen die Behandlung abzubrechen und ein Zahnarzt zu konsultieren ist.
- Die endgültige Farbe stellt sich etwa 2 Wochen nach Beginn der Behandlung ein.

WARNHINWEISE
- enthält Fluorid
- enthält Wasserstoffperoxid
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- außer Reichweite von Kindern lagern
- nicht bei überempfindlichen Zähnen anwenden
- nicht essen, trinken oder rauchen, wenn sich die maßgefertigten, gefüllten Schienen im Mund befinden
- gesundheitsschädlich beim Verschlucken

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
- bei Verschlucken größerer Mengen (mehr als 25 % des Inhalts einer Spritze): sofort Wasser trinken, keinen Brechreiz auslösen und einen Arzt consultieren
- bei Augenkontakt: Augenlider auseinanderziehen, das Auge mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren
- bei Kontakt mit Kleidung, Haut oder Haaren: Kleidung entfernen, Haut oder Haare mit fließendem Wasser spülen

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN
Bei der Verwendung von Cavex Bite&White können unter anderem die folgenden unerwünschten Nebenwirkungen auftreten:

Empfindlichkeit
Bei einigen Patienten kann es während der Behandlung zu einer gesteigerten Kälteempfindlichkeit der Zähne kommen; bei anderen kann eine unbestimmte Empfindlichkeit von Zähnen, Zahnfleisch, Zunge, Lippen oder Kehle auftreten. In der Regel verschwinden diese Symptome einige Tage nach Beendigung der Behandlung. Die Behandlung kann dann fortgesetzt werden, wenn weniger häufige Anwendungen fortgesetzt werden, bis der gewünschte Bleaching-Effekt erreicht ist. Wenn die Probleme weiterhin auftreten, ist die Behandlung abzubrechen.

Zahnfleischreizungen
Bei Schienen, die das Zahnfleisch berühren, kann es zu mäßigen bis schweren Reizungen des weichen Gewebes kommen.
Vergewissern Sie sich bei gut passenden Schienen, ob der Patient die richtige Menge in der richtigen Weise verwendet.
Eventuell muss die Menge des Gels in der Schiene reduziert werden.

AUFBEWAHRUNG
- im Kühlschrank (+8°C) aufbewahren, dunkel und trocken lagern
- nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden

ENTSORGUNG
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.

F Mode d'emploi

DESCRIPTION
Cavex Bite&White contient de l'eau oxygénée en tant qu'agent de blanchiment. Elle est combinée avec l'urée sous forme de peroxyde de carbamide pour plus de stabilité. Le peroxyde de carbamide se dissout rapidement en radicaux d'oxygène et en eau. Pendant le blanchiment, les radicaux libres attaquent les doubles composés de carbone qui sont généralement à l'origine des décolorations des dents.

CONDITIONNEMENT
▶ Seringues Cavex Bite&White (3 ml)

COMPOSITION
Composants actifs :
- 16 % de peroxyde de carbamide – équivalant à 6 % de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)
- 0,2 % de désensibilisateur au nitrate de potassium
- 0,1 % de désensibilisateur au fluorure de sodium

UTILISATION
Cavex Bite&White est un produit de blanchiment qui est utilisé pour éclaircir la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White doit uniquement être administré par des dentistes, ou sur leurs instructions, à des personnes âgées de 18 ans ou plus. Il est recommandé de consulter un dentiste agréé avant chaque traitement afin d'exclure tout problème buccal ou sanitaire.

CONTRE-INDICATIONS
Il est recommandé de consulter un médecin dans les cas suivants :
- femmes enceintes et allaitantes
- personnes traitées pour une maladie grave.

PROCEDURE CLINIQUE
- Déterminez la couleur initiale, évaluez l'état de santé actuel des dents et faites en sorte que les attentes du patient concernant le résultat final soient réalistes.
- Les restaurations provisoires ou temporaires de la dentition peuvent se décolorer pendant le blanchiment alors que les matériaux en composite ou polycarbonate n'en sont pas affectés. C'est pourquoi les patients concernés doivent être informés que les composites devront peut-être être remplacés étant donné que le blanchiment n'est efficace que sur les dents naturelles.
- Pour les patients ayant besoin d'une restauration esthétique ou adhésive, attendez 2 semaines après le dernier blanchiment afin que la couleur puisse se stabiliser. Toutes les restaurations doivent être intactes ou bien scellées avec les matériaux provisoires adaptés.
- Il convient de recommander d'utiliser un dentifrice pour dents sensibles 2 semaines avant le traitement et jusqu'à 2 semaines après.
- Avertissez toujours le patient que ses dents seront sensibles ou ses gencives irritées pendant le traitement. Les gencives en contact avec le produit peuvent rougir ou blanchir, mais reprennent leur couleur normale au bout de quelques jours.
- Conseillez au patient – pour éviter d'irriter les tissus mous - de ne pas surcharger la tablette, d'éliminer le surplus de gel en bordure des gencives et de bien rincer la bouche après le traitement.
- Précisez au patient qu'il faut toujours remettre le capuchon sur la seringue après chaque traitement.
- Le patient ne doit pas manger, boire ni fumer pendant au moins 60 minutes après chaque traitement.
- Demandez au patient d'interrompre le traitement et de vous contacter immédiatement en cas de problème.
- La couleur finale apparaît 2 semaines environ après le début du traitement.

AVERTISSEMENTS
- Contient du fluorure.
- Contient du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
- Evitez tout contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensitivité des dents.
- Ne pas manger, boire ni fumer pendant le port de la tablette garnie sur mesure.
- Danger en cas d'ingestion.

PREMIERS SECOURS
- Si une quantité importante (plus de 25 % du gel contenu dans la seringue) a été ingérée : boire de l'eau immédiatement, ne pas provoquer de vomissement et consulter un médecin.
- Si le gel entre en contact avec les yeux : écarter les paupières, rincer l'œil à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
- En cas de contact avec les vêtements, la peau ou les cheveux : retirer les vêtements touchés et rincer la peau ou les cheveux à l'eau courante.

EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES
Les effets indésirables pouvant être liés à l'utilisation de Cavex Bite&White sont notamment les suivants:

Sensibilité
Certains patients peuvent présenter pendant le traitement une sensibilité accrue des dents au froid. D'autres une sensibilité non spécifique des dents, des gencives, de la langue, des lèvres ou de la gorge.
D'une manière générale, les symptômes doivent disparaître quelques jours après la fin du traitement. Le traitement peut être poursuivi avec des applications plus brèves et moins fréquentes jusqu'à ce que le degré de blanchiment souhaité soit atteint. Si la gêne subsiste, le traitement doit être arrêté.

Irritation des gencives
Les tablettes qui s'étendent jusqu'aux gencives peuvent provoquer des irritations modérées à graves des tissus mous.
Si les tablettes s'ajustent bien, vérifiez que le patient applique correctement la bonne quantité.
Le patient devra peut-être réduire la quantité de gel dans les tablettes.

CONSEIL DE CONSERVATION
- Conserver au réfrigérateur (+8°C) dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- Ne pas utiliser après la date limite de conservation.

DECHETS
- Jeter le produit conformément aux consignes locales en matière de déchets.

GB Instructions for use

DESCRIPTION
Hydrogen peroxide is the bleaching agent in Cavex Bite&White. It is added as carbamide peroxide in order to obtain a sufficiently stable product. The carbamide peroxide breaks down rapidly into oxygen radicals and water. During the whitening process the free radicals attack the double carbon bonds that are the source of most colours (stains) in the tooth.

PACKAGING
▶ Cavex Bite&White 3 ml syringes

COMPOSITION
Active substances:
- 16% Carbamide Peroxide – equivalent to
  - 6 % hydrogen peroxide
- 0.2 % Potassium nitrate desensitizer
- 0.1 % Sodium fluoride desensitizer

INDICATIONS FOR USE
Cavex Bite&White is a whitening product used to lighten the colour of natural teeth. Cavex Bite&White should only be dispensed by or on the order of a dental professional to people over the age of 18. A consultation with a qualified dentist is recommended before beginning the whitening procedure to check for any underlying oral or health issues.

CONTRAINDICATIONS
Any patient falling into one of the categories below is advised to consult a doctor to starting the treatment:
- Pregnant and lactating women.
- Those currently being treated for a serious illness.

CLINICAL PROCEDURE
- Record starting shade, review current dental health and make sure patient has realistic expectations for the final results.
- Provisional or temporary restorations may discolour during the whitening process while composite or polycarbonate materials will remain unaffected. Therefore, patients with composite restorations must be advised that existing composites may require replacement, since only natural teeth will whiten.
- For patients requiring aesthetic or adhesive restorations, wait 2 weeks after the last whitening treatment to allow for colour stabilization. All restorations should be intact or well sealed with adequate temporary materials.
- The use of a sensitivity relief product starting 2 weeks prior to the treatment procedure until 2 weeks after the treatment should be advised.
- Patients should always be warned of tooth sensitivity or gingival irritation during the treatment. The gingival areas that come in contact with the product could turn red or white but will return to its normal colour after several days.
- To avoid soft tissue irritation, advise the patient to avoid overfilling trays, to wipe away any excess gel from the gum line and to rinse the mouth thoroughly after the treatment.
- After each treatment, make sure patient replaces the syringe cap.
- The patient should not eat, drink or smoke tobacco for at least 60 minutes after each treatment.
- Instruct the patient to stop the treatment and contact you immediately if any problem develops.
- The final shade will be achieved about 2 weeks after the start of the treatment.

WARNINGS
- Contains Fluoride.
- Contains Hydrogen Peroxide.
- Avoid contact with eyes.
- Keep out of reach of children.
- Avoid exposure if known hypersensitive teeth.
- Do no eat, drink or smoke while wearing the filled custom-fitted trays.
- Harmful when swallowed.

FIRST AID INSTRUCTIONS
- If a large quantity (over 25% of the gel in the syringe) is swallowed, immediately drink water, do not induce vomiting and contact a doctor.
- If gel gets into eyes, hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water for at least 15 minutes and contact a doctor.
- If clothing, skin or hair comes in contact, remove contaminated clothing and flush skin or hair with running water.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS
Adverse effects that may be associated with the use of Cavex Bite&White include, but are not limited to:

Sensitivity
Some patients may experience increased tooth sensitivity to cold during the treatment, while others may have non-specific sensitivity in their teeth, gums, tongue, lips or throat.
In general symptoms should disappear within several days after the treatment is stopped. The treatment can be proceeded with shorter, less frequent applications until the desired whitening effect has been achieved. If discomfort persists, discontinue the treatment.

Gingival Irritation
Trays that extend onto the gingiva may cause mild to severe soft tissue irritation.
If the trays fit properly, check if the patient applies the proper quantity in the proper way.
The patient may need to reduce the amount of gel in their trays.

STORAGE ADVICE
- Store refrigerated (+8°C) in a dark, dry place.
- Do not use the material after the expiry date.

DISPOSAL
- Dispose of device in accordance with local waste regulations.

I Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE
L'acqua ossigenata è l'agente sbiancante contenuto in Cavex Bite&White e viene aggiunto sotto forma di perossido di carbamide. A sua volta, il perossido di carbamide si decompone rapidamente in radicali dell'ossigeno e acqua. Durante il processo di sbiancamento, i radicali liberi attaccano i legami doppi di carbonio, che sono la causa più comune della maggior parte delle macchie di colore sui denti.

CONFEZIONE
▶ Cavex Bite&White siringhe (93 ml)

COMPOSIZIONE
Sostanze attive:
- 16% di perossido di carbammide – equivalente al 6% di acqua ossigenata
- 0,2 % di nitrato di potassio desensibilizzante
- 0,1% di fluoruro di sodio - desensibilizzante

INDICAZIONI PER L'USO
Cavex Bite&White è un prodotto sbiancante per schiarire il colore dei denti naturali. Cavex Bite&White può essere distribuito solamente da o su richiesta del dentista a persone d'età superiore ai 18 anni. Prima di ogni trattamento sbiancante, si consiglia di consultare un dentista per accertare l'assenza di problemi di salute o del cavo orale.

CONTROINDICAZIONI
Si consiglia di consultare un medico prima del trattamento a:
- donne in gravidanza e durante l'allattamento.
- persone trattate per malattia grave.

PROCEDURA CLINICA
- Definire il colore di partenza, valutare la salute attuale dei denti e assicurarsi che il paziente abbia aspettative realistiche riguardo il risultato finale.
- Durante lo sbiancamento, materiali provvisori o temporanei possono scolorire, mentre il prodotto non avrà alcuna influenza su materiale composito o polycarbonato. Per questo motivo, è necessario informare i pazienti con restauri effettuati con materiali composite, che i compositi attuali dovranno probabilmente essere sostituiti, in quanto possono essere sbiancati solo i denti naturali.
- Nei casi di pazienti che necessitano di restauri estetici o adesivi, attendere due settimane dopo l'ultimo sbiancamento; in questo modo il colore può stabilizzarsi. Tutti i restauri devono essere intatti, o ermeticamente sigillati con materiali provvisori.
- Si deve consigliare l'uso di un prodotto per denti sensibili, da 2 settimane prima del trattamento fino a 2 settimane dopo.
- Si deve sempre avvertire il paziente che durante il trattamento i denti diventeranno sensibili e che le gengive potrebbero irritarsi. La gengiva che viene a contatto con il prodotto può diventare rossa o bianca, ma dopo qualche giorno, riprende il suo colore naturale.
- Per prevenire l'irritazione dei tessuti molli, consigliare al paziente di non sovracaricare il portaimprontа, togliere il gel in eccesso lungo il bordo della gengiva e sciacquare bene la bocca dopo il trattamento.
- Fare presente al paziente che, dopo ogni trattamento, occorre chiudere la siringa utilizzando l'apposito tappo.
- Dopo ogni trattamento, per almeno 60 minuti il paziente non deve mangiare, bere o fumare.
- Qualora si dovessero verificare problemi Indicare al paziente di interrompere il trattamento.
- Il colore finale si ottiene circa 2 settimane dopo l'inizio del trattamento.

AVVERTENZE
- Contiene fluoro.
- Contiene perossido ossigenata.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non applicare su denti ipersensibili.
- Durante l'applicazione del prodotto, con il portaimprontа non mangiare, bere o fumare.
- Prodotto pericoloso se ingerito.

CIRCUZIONI IN CASO DI SOCCORSO
- In caso di ingestione di una grande quantità (più del 25% del gel contenuto nella siringa), bere immediatamente acqua; non indurre il vomito e contattare un medico.
- Se il gel viene a contatto con gli occhi: aprire le palpebre, sciacquare gli occhi per almeno 15 minuti senza interruzione e consultare un medico.
- In caso di contatto con vestiti, pelle o capelli: togliere gli abiti e sciacquare la pelle o i capelli con acqua corrente.

POSSIBILI EFFETTI NOCIVI
Gli effetti nocivi dovuti dei possibili effetti nocivi che possono essere correlati all'uso di Cavex Bite&White:

Sensibilità
Durante il trattamento, alcuni pazienti possono notare un aumento della sensibilità dei denti al freddo; altri possono manifestare una sensibilità non specifica dei denti, della gengiva, della lingua, delle labbra o della gola.
In generale i sintomi scomparirannno entro qualche giorno dall'interruzione del trattamento. Si può continuare il trattamento con applicazioni più brevi e meno frequenti, fino a ottenere l'effetto desiderato. Se il fastidio persiste interrompere definitivamente il trattamento.

Irritazione della gengiva
I portaimprontа che coprono le gengive possono provocare un'irritazione moderata o grave dei tessuti molli. Qualora i portaimprontа siano della misura giusta, controllare che il paziente adoperi la corretta quantità di gel seguendo le indicazioni d'uso, probabilmente il paziente dovrà utilizzare una quantità minore di gel.

CONSIGLIO PER LA CONSERVAZIONE
- Conservare in frigorifero (+8°C), in un luogo asciutto e buio.
- Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.

SMALTIMENTO
- Smaltire il prodotto conformemente alle regole vigenti in materia.

E Instrucciones de uso

DESCRIPCION
El peróxido de hidrógeno es el agente blanqueador que contiene Cavex Bite&White. Se añade como peróxido de carbamida para conseguir un producto suficientemente estable. El peróxido de carbamida se disuelve con rapidez en los radicales del oxígeno y en el agua. Durante el proceso de blanqueo los radicales libres atacan los enlaces dobles del carbono, que son la fuente de la mayoría de colores (manchas) en los dientes.

ENVASE
▶ Jeringas de 3 ml Cavex Bite&White

COMPOSICION
Ingredientes activos:
- 16 % Peróxido de Carbamida – equivalente a 6 % de peróxido de hidrógeno
- 0,2 % Desensibilizante nitrato de potasio
- 0,1 % Desensibilizante fluoruro de sodio

INDICACIONES PARA EL USO
Cavex Bite&White es un producto de blanqueamiento dental que aclara el color de dientes naturales. Cavex Bite & White solo debe ser administrado por o por orden de un odontólogo a personas mayores de 18 años. Antes de cada tratamiento de blanqueamiento se recomienda consultar a un odontólogo calificado para descartar problemas orales o de salud.

CONTRAINDICACIONES
Se recomienda a las siguientes personas consultar a un médico antes de iniciar el tratamiento:
- Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
- Personas en tratamiento por una enfermedad grave.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO
- Se debe establecer el color de los dientes antes de iniciar del tratamiento, evaluar el estado de salud dental actual y asegurarse que el paciente tiene expectativas reales acerca de los resultados finales.
- Las restauraciones provisionales o temporales pueden decolorarse durante el proceso de blanqueamiento, aunque los materiales de composite o policarbonato no se verán afectados. Por tanto, se debe informar a los pacientes que tengan restauraciones con composite sobre la necesidad de cambiar los composites existentes porque únicamente se blanquearán los dientes naturales.
- Para los pacientes que requieran una restauración estética o adhesiva, esperar dos semanas después del último tratamiento de blanqueamiento para permitir la estabilización del color. Todas las restauraciones deben estar intactas o bien selladas con los materiales provisionales adecuados.
- Se recomienda utilizar un producto para dientes sensibles 2 semanas antes y hasta 2 semanas después del tratamiento.
- Se debe advertir siempre al paciente sobre la sensibilidad de los dientes o irritación gingival durante el tratamiento. Las áreas gingivales que entren en contacto pueden tornarse rojas o blancas pero retornarán a su color normal después de varios días.
- Para evitar el irritación del tejido blando, se debe advertir al paciente que evite sobrellenar las cubetas, limpiar los excesos de gel de la línea de la encía y enjuagar la boca minuciosamente después del tratamiento.
- Después de cada tratamiento, asegúrese que el paciente coloque de nuevo la tapa de la jeringa. Recomiende al paciente que vuelva a poner el tapón en la jeringa tras cada aplicación.
- El paciente no debe comer, beber ni fumar por lo menos hasta 60 minutos después del tratamiento.
- Instruya al paciente para detener el tratamiento y contactarlo inmediatamente si se desarrolla algún problema.
- El color final se logrará alrededor de 2 semanas después de iniciar el tratamiento.

ADVERTENCIAS
- Contiene fluor.
- Contiene Peróxido de Hidrógeno.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar la exposición de dientes hipersensibles conocidos.
- No se debe comer, beber ni fumar mientras se llevan las cubetas rellenas de fabricación propia.
- Nocivo cuando se ingiere.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Si se ingiere una gran cantidad de producto (más del 25% del gel que contiene la jeringa), beber agua inmediatamente, no inducir vómito, y ponerse en contacto con un médico.
Si el gel entra en contacto con los ojos, sostenga los párpados separados y enjuague el ojo continuamente con agua corriente por lo menos 15 minutos y ponerse en contacto con un médico.
Si se produce contacto con la ropa, la piel o el cabello, quítese la ropa contaminada y enjuague la piel o el cabello con agua corriente.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos que pueden asociar con el uso de Cavex Bite&White incluyen, pero no están limitados a:

**Sens

H Használati utasítás

LEÍRÁS
A Cavex Bite&White foghehérítő hatóanyaga a hidrogén-peroxid, melyet a megfelelő stabilitás érdekében karbamid-peroxid formájában tartalmaz a termék. A karbamid-peroxid szabad oxigén-gyökök és víz jelenlétében gyorsan lebomlik. A fehérítés során a szabad gyökök megtámadják a kettős szénkötéseket, melyek azokban a festékszemcsékben találhatók, amik időbenyre a fogelszínződés fő okai jelentik.

CSOMAGOLÁS
▪ Cavex Bite&White fecskendőtubus (3 ml)

ÖSSZETÉTEL
Aktív hatóanyagok:
▪ 16 % karbamid-peroxid – mely 6 % hidrogén-peroxidnak felel meg
▪ 0,2 % kálium-nitrát-desenzibilizáló
▪ 0,1 % nátrium-fluorid desenzibilizáló

HASZNÁLATI JAVASLATOK
A Cavex Bite&White egy olyan foghehérítő zselé, melynek használata során a termelésre fogak színe fehérödik fel. A Cavex Bite&White foghehérítő csak fogkrait szakember által vagy annak utasításra adható ki. 16 év felettek számára. A foghehérítési kezelés megkezdése előtt javasoljuk, hogy kérje fogorvos tanácsát az esetleges szájb., vagy egyéb egészségügyi problémák megoldása érdekében.

ELLENJAVALLATOK
Alábbiakban javasoljuk, hogy a kezelés előtt kérjék orvos tanácsát:
▪ terhes és szoptató nők.
▪ súlyos belgyógyi miatt kezelt személyek.

KLINIKAI ELJÁRÁS
▪ Jegyezze fel (fényképezze) le a kiindulási szint, vizsgálja meg a fogazat jelenlegi állapotát és gondoskodjon arról, hogy a páciensnek reális elvárásai legyenek a végeredmény illetően.
▪ Az ideálisnak helyettesítőnek a fehérítés folyamata során elszíneződésének, majd a szer a komposzit, vagy porlakorbál alapú anyagokra nincs hatással. Ezért a komposzit-restaurációk vagy helyettesítőek páciensenkét tájékoztatni kell, hogy a megilelő komposzitjaikat esetleg ki kell cserélni, mivel az eljárás során csak a fertemesztés fogak fognak kifehérödni.
▪ A fivábói esztétikus, vagy tapasztalt restaurációt igénylő páciensenkél a szín stabilizálódása érdekében várjon kell hetet a legutóbbi fehérítési kezelés után. Minden helyettesítőnek annak, vagy jól kezelnek kell lenne a meglévő degláenes anyagok alkalmazásak.
▪ A kezelés előtt 2 héttel, és a kezelés után még 2 héttig javasoljuk egy érzékeny fogakra való termek használatát.
Mindig figyelmeztesse a pácienst, hogy a kezelés során fogérzékenységig, vagy ínyirritáció jelentkezhet. Az ínynek az a része, mely a foghehérítővel érintkezik bepercsodhat, vagy elfehérödhet, de néhány nap után visszatér az eredeti színre.
▪ A légzőszervi irritációjának megelőzése érdekében tanácsolja pácienseinek, hogy ne fújtat sír az egyién-kanalat. Illetve törölje le az ily szélén lévő folódóges zselét, és a kezelés után jól öblítse ki a száját.
▪ Figyelmeztesse a pácienst, hogy a fecskendőtubus zárókupakját minden kezelés után zárja vissza!
▪ A páciens a kezelés után legalább 60 percig nem ehet, nem ihat, és nem dohányozhat.
▪ Figyelmeztesse a pácienst, hogy azonnal hagyja abba a kezelést és keresse meg Orvt, ha bármilyen problémát tapasztal.
▪ A véglegesz szín kb. 2 héttel a kezelés megkezdése után jelentkezik.

FIGYELMEZTETÉSEK
▪ Fluoridot tartalmaz.
▪ Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
▪ Kerülje az anyag szemébe jutását.
▪ Tartsa gyermekektől távol.
▪ Erőskony fogak esetén ne használja.
▪ A mérésre szánott, foghehérítővel megvilágított szájüreg viselése közben ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon.
▪ Az anyag lenyelése veszélyes.

UTASÍTÁSOK ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ESETÉN
▪ Ha az anyag jelentős részét (a fecskendőben lévő zselé több mint 25%-át) lenyelt, azonnal igyon vizet, és hányásszon ki folyadékot.
▪ Ha szemébe kerül a zselé: húzza szét a szemhéjakat, és alaposan mossa ki a szemet legalább 15 percen át folyó vízzel, majd forduljon szemorvoshoz.
▪ Ruházat, bőrnel, vagy hajjal való érintkezés esetén: vesse le a beszennyezett ruhát, és a bőrt, vagy a hajat folyó vízben öblítse le.

ESETLEGES KÁROS HATÁSOK
A Cavex Bite&White foghehérítő zselé használata során az alábbi (de nem kizárólagos) káros mellékhatások jelentkezhetnek:

Érzékenység
Egyes pácienseknél a kezelés során a fogak hőegre történő fokozott érzékenysége jelentkezhet, míg másoknál a fogak, az íny, a nyelv, az ajkak és a torok átalános (nem specifikus) érzékenysége fordulhat elő.
A tünetek általában a kezelés befejezése után néhány perc belül elmúlnak. A foghehérítést rövidebb és ritkább gyakorisági kezelések alkalmazásával folytatni lehet, amíg a kívánt fehérítési hatást el nem ér. Ha az érzékenység nem múlik, akkor a kezelést abba kell hagyni!

Az íny irritációja
Ha a foghehérítőhez használt egyéni-kanál, hozzáér az ínyhez, akkor a lágyszövet kémiai erősségű irritációja fordulhat elő.
Ha az egyéni-kanál pontosan illeszkedik – de az irritáció fennáll – akkor ellenőrizze, hogy a páciens a fehérítő zselét megfelelő mennyiségben alkalmazza-e.
Előfordulhat, hogy a pácienseik csökkentenie kell az egyéni-kanálba kitett zselé mennyiségét.

TÁROLÁSI TANÁCSOK
▪ Tartsa a hűtőszekrényben (8ºC alatt), sötét, száraz, sötét helyen.
▪ A szavatossági idő lejárta után már ne használja a foghehérítőt.

HULLADÉK KEZELÉS
▪ A helyi hulladékfeldolgozási előírásoknak megfelelően dobja el a termék hulladékát.

PL Instrukcja

OPIS
Nadtlenek wodoru to czynnik wybielający w Cavex Bite&White. Jest dodawany jako nadtlenek karbamidu, co zapewnia odpowiednią stabilność produktu. Nadtlenek karbamidu szybko rozpuszcza się w rozdrobnych fibrowych i wodzie. W trakcie procesu wybielania wolne rodniki atakują podwójne związki węgla; to właśnie one stanowią zazwyczaj przyczynę przebarwienia zębów.

OPAKOWANIE
▪ Cavex Bite&White strzykawka (3 ml)

SKŁAD
Aktywne składniki:
▪ 16 % nadtlenek karbamidu – odpowiada
  ↳ 6 % nadtlenku wodoru
▪ 0,2 % azotan potasu-desensybilizator
▪ 0,1 % fluorek sodu-desensybilizator

WSKAZANIA DO UŻYCIA
Cavex Bite&White to produkt do wybielania zębów służący do rozjaśniania koloru naturalnych zębów. Cavex Bite&White powinien być stosowany wyłącznie przez stomatologa lub na jego zalecenie osobom w wieku powyżej 18 lat. Aby wykluczyć problemy ze zdrowiem albo jamą ustną przed kładzeniem wybielaniem zalecane jest umówienie się na konsultację z wykwalifikowanym dentystą albo higienistą jamy ustnej.

PRZECIWWSKAZANIA
Poniższych sytuacjach zaleca się zasięgnąć porady lekarskiej przed przystąpieniem do wybielania:
▪ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
▪ Osób z przewlekłe chorzy.

PROCEDURA KLINICZNA
▪ Należy ustalić kolor wyjściowy, ocenić bieżący stan zdrowia uzębienia i zadbać o to, by oczekiwania pacjenta w stosunku do efektów były realistyczne.
▪ Wypełnienie typu flezer może ulec przebarwieniu w trakcie procesu wybielania, w chwili gdy nie ma on żadnego wpływu na materiał kompozytowy lub polilewglanowy. W związku z tym należy poinformować pacjentów o zbędzie z materiałów kompozytowych, że istniejące kompozyty powinny zostać wymienione, biorąc pod uwagę fakt, że tylko zęby naturalne stanu się bielsze.
▪ W przypadku pacjentów o bardzo estetycznych oczekiwaniach lub osób z zastosowaniem spowa, należy odczekać 2 tygodnie od ostatniego zabiegu wybielania, które dopiero wówczas się ustabilizuje. Wszystkie naprawy powinny zostać nieznacznie lub dobrze zabezpieczone odpowiednim materiałem kompozytowym.
▪ Zaleca się stosowanie produktu wrażliwych, na 2 tygodnie przed zabiegiem i 2 tygodnie po zabiegu.
▪ Należy zawsze ostrzec pacjenta przed wrażliwością zębów oraz podrażnieniem dziąseł w trakcie zabiegu. Dziąsła, które mają skyznować z produktem, mogą stać się czerwone lub blade, ale po kilku dniach ich naturalny kolor powróci.
▪ Aby zapobiec podrażnieniu tkanki miękkiej należy poinformować pacjenta, aby nie nakładał zbyt dużo żelu, a jego nadmiar usunął przy granicy dziąseł oraz aby opukał jamę ustną dokładnie po zabiegu.
▪ Należy zwrócić uwagę pacjentowi, aby po każdym zabiegu należy ponownie zamykać strzykawkę przy pomocy osłonki.
▪ Pacjentowi nie wolno spożywać posiłków, napojów ani palić przez 60 minut po zabiegu.
▪ Należy poinformować pacjenta, aby natychmiast wstrzymał zabieg jeśli w jego trakcie wystąpią
  jakieś problemy.
▪ Ostateczny kolor pojawi się na około 2 tygodnie od chwili rozpoczęcia zabiegu.

OSTRZEŻENIA
▪ Zawiera fluorek.
▪ Zawiera nadtlenek wodoru.
▪ Unikać kontaktu z oczami.
▪ Trzymać poza zasięgem dzieci.
▪ Nie stosować w przypadku nadwrażliwych zębów.
▪ Nie spożywać posiłków, napojów, ani nie palić w trakcie noszenia wypełnionej podstawki.
▪ Produkt niebezpieczny w przypadku połknięcia.

PIERWSZA POMOC
▪ W przypadku połknięcia dużej ilości produktu (więcej niż 25% żelu w strzykawce): należy natychmiast wypłukać usta i wypić dużo powodować wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.
▪ Jeśli produkt rozchlacha z oczami: należy otworzyć szeroko powieki, płukać oczy przez przynajmniej 15 minut wodą i zasięgnąć porady lekarza.
▪ Jeśli produkt ulegnie zanieczyszczeniu, skóra lub włosami: należy zdjąć skażone ubranie, a skórę lub włosy opłukać pod bieżącą wodą.

MOŻLIWE EFEKTY UBOCZNE
Efektami ubocznymi związanymi ze stosowaniem Cavex Bite&White to między innymi:

Wrażliwość
Niektórzy pacjenci w trakcie zabiegu mogą doświadczać nadmierną wrażliwości zębów na zimno, inne osoby mogą skarżyć się na nadwrażliwość zębów, dziąseł, języka, ust lub gardła.
Ogólne wszelkie objawy powinny ustąpić na kilka dni po zakończeniu zabiegu. Zabieg można kontynuować, obniżając częstotliwość zabiegów, a częstotliwość aż do osiągnięcia pożądanego efektu wybielania. Jeśli nieprzyjemne uczucie będzie się utrzymywać, należy zakończyć zabieg.

Podrażnienie dziąseł
Podstawki, które wystają do wysokości dziąseł, mogą powodować umiarkowane lub ograniczone podrażnienie tkanki miękkiej.
Jeśli podstawki są obrzęce dopasowane, należy sprawdzić czy pacjent zastosował odpowiednią ilość żelu.
Być może pacjent powinien zmniejszyć ilość żelu w podstawce.

ZALECANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
▪ Przechowywać w lodówce (+8°C) w ciemnym, suchym miejscu.
▪ Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

UTYLIZACJA
▪ Usunąć produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Hollandi gyártmány

Limitált garancia
A Cavex Bite&White tanácsai – akár írott, akár szóban adott – a maximális jószándék és segítőkészség jegyében születtek, ám nem garantálnak semmit. Ilyenez vonatkozik a márkakereskedőknél kapott információkra is! Ez nem szüntethi meg a felhasználó felelősségét, hogy kipróbálja és teszteje az általunk szállított termeket, illetve meggyőződjön az anyag alkalmasságáról a kívánt kezelési módra. A felhasználónak kell felelősséget vállalnia az ajánlott termékek – vagy azok egyéb felelőssége – miatt más a cég felügyelete és ellenőrzése alatt történik – ez kizárólag a fogorvos, és betege feladata. Ha mindezek ellenére bármilyen kár keletkezik, vagy a Cavex Bite&White adódó orvosi károsodás lép fel, a cég csak ezen limitált garancia keretén belül, a megvásárolt termék árának megfelelő értékben vállal felelősséget. A Cavex cég semmilyenen mindent megtesz, hogy folyamatosan a lehető legmagasabb minőségben szállítsa termékeit, a cég Általános forgatási szabályzata és felétítési feltételei szerint.

P Instruções de utilização

DESCRIÇÃO
O peróxido de hidrogénio é o agente de clareamento utilizado no Cavex Bite&White. É adicionado como peróxido de carbamida para que se obtenha um produto suficientemente estável. O peróxido de carbamida decompõe-se rapidamente em radicais de oxigénio e água. Durante o processo de clareamento, os radicais livres atacam as ligações duplas de carbono que são a fonte da maioria das colorações (manchas) dentárias.

EMBALAGEM
▪ Cavex Bite&White em seringas de 3 ml

COMPOSIÇÃO
Ingredientes activos:
▪ 16% de peróxido de carbamida – equivalente a 6 % de peróxido de hidrogénio
▪ 0,2% de agentes dessensibilizantes à base de nitrato de potássio
▪ 0,1 % de agentes dessensibilizantes à base de fluoreto de sódio

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Cavex Bite&White é um produto de clareamento dentário utilizado na diminuição da coloração de dentes naturais. O Cavex Bite&White deve ser administrado mediante indicação ou por um profissional de odontologia a pessoas com mais de 18 anos. Antes de qualquer procedimento de clareamento, recomenda-se a consulta de um dentista qualificado para assegurar que não existem problemas de saúde ou oral subjacentes.

CONTRA-INDICAÇÕES
Antes do tratamento, as seguintes pessoas devem consultar um médico:
▪ Mulheres grávidas ou a amamentar
▪ Pessoas com problemas de doença grave

PROCEDIMENTO CLÍNICO
▪ Registre a cor inicial, verifique a saúde dentária atual e certifique-se de que o paciente tem expectativas realistas quanto aos resultados finais.As restaurações temporárias ou provisórias podem sofrer descoloração durante o processo de clareamento, ao passo que as restaurações em policarbonato ou compósitos não sofrerão qualquer alteração. Assim, os pacientes com restaurações em compósito devem ser informados de que pode ser necessário substituir os compósitos existentes, uma vez que apenas os dentes naturais irão ser clareados.
▪ Para pacientes que necessitem de restaurações adesivas ou estéticas, aguarde 2 semanas após o clareamento. Isto assegura que a cor dos dentes se estabilize.Ajuda da cor. Todas as restaurações devem estar intactas ou bem seladas com os materiais temporários adequados.
▪ Deve ser recomendada a utilização de um dentífrico para alívio da sensibilidade dentária 2 semanas antes do tratamento e até 2 semanas após o mesmo.
▪ Os pacientes devem ser informados da possibilidade de ocorrência de sensibilidade dentária ou irritação das gengivas durante o tratamento. As áreas da gengiva que entrem em contato com o produto podem ficar vermelhas ou brancas mas recuperam a sua cor normal após alguns dias.
▪ Para evitar a irritação dos tecidos moles, aconselhe o paciente a evitar encher as moldeiras em demasia, a limpar quaisquer excessos de gel da linha das gengivas e a enxaguar a boca bem após o tratamento.
▪ Após cada tratamento, certifique-se de que o paciente volta a colocar a tampa da seringa.
▪ O paciente não deve comer, beber ou fumar durante, pelo menos, 60 minutos após o tratamento.
▪ Informe o paciente de que deve parar o tratamento e contatá-lo imediatamente se algum dos sintomas se manifestar.
▪ A cor final será atingida cerca de 2 semanas após o início do tratamento.

ADVERTÊNCIAS
▪ Contém fluoreto.
▪ Contém peróxido de hidrogénio.
▪ Evitar o contacto com os olhos.
▪ Manter fora do alcance das crianças.
▪ Evitar a exposição de dentes hipersensibilizadas conhecida.
▪ Não comer, beber ou fumar durante a utilização das moldeiras.
▪ Nocivo se ingerido.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
▪ Em caso de ingestão de uma grande quantidade (mais de 25% do gel na seringa), beba imediatamente água, não tente provocar o vómito e contate um médico.
▪ Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água corrente, durante, pelo menos, 15 minutos, mantendo as pálpebras, e contate um médico.
▪ Em caso de contato com as roupas, pele ou cabelo, retire a roupa contaminada e lave a pele ou cabelo com água corrente.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS
Os efeitos que podem estar relacionados com a utilização de Cavex Bite&White incluem, mas não estão limitados a:

Sensibilidade
Alguns pacientes podem sentir maior sensibilidade dentária ao frio durante o tratamento, enquanto outros podem sentir sensibilidade não especificada nos dentes, gengivas, língua, lábios ou garganta.
Em geral, os sintomas deverão desaparecer alguns dias após o fim do tratamento. O tratamento pode prosseguir, com aplicações mais curtas e menos frequentes, até ser conseguido o efeito de clareamento pretendido. Se a sensação de desconforto persistir, interrompa o tratamento.

Irritação das gengivas
As moldeiras que sexetenderem até à gengiva podem provocar irritação ligeira a grave dos tecidos moles.
Se as moldeiras encaixarem corretamente, verifique se o paciente aplica a quantidade adequada da forma correta.
Poderá ser necessário que o paciente reduza a quantidade de gel nas moldeiras.

CONSELHOS DE ARMAZENAMENTO
▪ Guardar em local fresco (+8°C) e seco, afastado da luz.
▪ Não utilizar o material após a data de vencimento.

ELIMINAÇÃO
▪ Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos locais para eliminação de resíduos.

Vyrobeno v Holandsku

Informace technickou na temat naszego produktu ka przekazane wyłącznie w dobrej wierze, ale bez gwarancji i to stosuje się również w momencie gdzie własnoc praw osób trzecich wchodzi w grę. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zbadania przez Ciebie materiałów przez nas dostarczonych pod kątem zastosowania. Porównaj zastosowanie w/w materiałów oraz jego użycie odbywa się poza naszą kontrolą, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

S Bruksanvisning

BESKRIVNING
Väteperoxid tjänar som blekningsmedel i Cavex Bite&White. Den tillsätts som karbamidperoxid för att ge en tillräcklig stabil produkt. Karbamidperoxiden upplöses snabbt i syreradikaler och vatten. Under blekningsprocessen attrifter de fria radikalerna de dubbla kolföreningarna; dessa utgör för det mesta orsaken till misstäkning av tänderna.

FÖRPACKNING
▪ Cavex Bite&White sprutor (3 ml)

SAMMANSTÄLLNING
Aktiva ingredienser:
▪ 16 % karbamidperoxid – lika med 6 % väteperoxid
▪ 0,2 % hasassnyt gödsel-potassium nitrat
▪ 0,1 % natriumfluorid-desensitizer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
Cavex Bite&White är en blekningsprodukt för att göra naturliga tänder ljusare. Cavex Bite&White får endast tillhandahållas av eller på uppdrag av en tandläkare, till personer som är 18 år eller äldre. Innan du genomgår tandblekare rekommenderas före varje blekning, för att utesluta mun- eller hälsoproblem.

KONTRAINDIKATIONER
Följande personer rekommenderas att konsultera en läkare före behandlingen:
▪ Gravida kvinnor och kvinnor som ammar
▪ Personer som behandlas för en allvarlig sjukdom

KLINISK PROCEDUR
▪ Fastställ utgångsfärgen, utvärdera tändernas nuvarande hälsa och se till att patientens förväntningar över slutresultatet är realistiska
▪ Provisoriska eller tillfälliga tandfyllningar kan missfärgas under blekningsprocessen, medan kompositt- eller polykarbonat materialet inte påverkas av blekningsmedlet. Det är av detta skäl som patienterna med kompositfyllningar att behöriga kompositet möjligen bör bytas ut, eftersom endast naturliga tänder blir vitare.
▪ Vänta 2 veckor efter den senaste restaurering med kompositfyllningar att färgen kan stabiliseras, då det gäller patienter som behöver en estetisk behandling eller en behandling med tandemedel. Alla lagningar ska vara intakta och väl applicerade med de rätta tillfälliga materialen.
▪ Det är tillrådligt att använda en produkt för känsliga tänder 2 veckor före och 2 veckor efter behandlingen.
▪ Varna alltid patienten att det kan uppstå känslighet i tänderna eller irritation i tandköttet under behandlingen. Tandköttet som kommer i kontakt med produkt kan bli rött eller vitt, men återtar efter några dagar sin normala färg.
▪ Ge patienten råd att inte tillägga gel för mycket gel i skenan för att undvika irritation av mjuk vävnad och att avlägsna överflödigt gel på gränsen till tandköttet och att skölja munnen ordentligt efter behandlingen.
▪ Påpeka för patienten att skruva på locket på sprutan efter varje behandling.
▪ Patienten bör inte äta, dricka eller röka efter varje behandling under minst 60 minuter.
▪ Instruera patienten att stoppa behandlingen och omedelbart kontakta er om det uppstår något problem.
▪ Den slutliga färgen framträder ca. 2 veckor efter behandlingens början.

VARNINGAR
▪ Innehåller fluorid.
▪ Innehåller väteperoxid.
▪ Undvik kontakt med ögonen.
▪ Hålles utom räckhåll för barn.
▪ Använd det inte vid överkänsliga tänder.
▪ Under tiden du bär den anpassade skenan ska du inte äta, dricka eller röka.
▪ Farligt att förtära.

INSTRUKTIONER VID FÖRSTA HJÄLPEN
▪ Om du svalt en stor mängd (mer än 25% av gelet i sprutan): drick genast vatten, framkalla inte kräkning och uppsök en läkare.
▪ Om du får gel i ögonen: dra upp ögonlocken och skölj under minst 15 minuter med vatten och konsultera en läkare.
▪ Vid kontakt med kläder, hud eller hår: avlägsna angripen klädsel och skölj hud eller hår under rinnande vatten.

EVENTUELLA TRÄDA EFFEKTER
Skadliga effekter som kan sammanhänga med användningen av Cavex Bite&White är bland andra men inte uteslutande:

Känslighet
Vissa patienter kan under behandlingen uppleva en tillfälgande känslighet för kyla i tänderna; andra kan uppleva en obestämd känslighet i tänder, tandkött, tunga, läppar eller strupe.
I allmänhet ska symptomen upphöra några dagar efter behandlingens slut. Behandlingen kan fortsätta med kortare applicering och mindre frekventa tillämpningar tills den önskade blekningseffekten har uppnåtts. Om besvåret förblir bör behandlingen avbrytas.

Irritation av tandköttet
Skenor som räcker upp till tandköttet kan ge en mättig till allvarlig irritation av mjuk vävnad.
Om skenorna passar bra, kontrollera då om patienten använder rätt mängd på rätt sätt. Det är möjligt att gelen bör minska mängden gel i skenorna.

FÖRVARING
▪ Förvara i kylskåp (+8°C) på en mörk, torr plats.
▪ Använd inte materialet efter bäst-före-datum.

AVFALL
▪ Avfärda produkten i överensstämmelse med lokala avfallsregler.

Tillverkat i Nederländerna

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har gätts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir aktuella. Det befriar ej er från skyldigheten att testa de produkter som tillhandahålles av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer.
Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hållet ett ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvarsskyldiga begränsas ansvaret till värdet av det gods som levererats av oss och avtalets av. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitet på våra produkter inom ramarna för gällande leveransbestämmelser.

TR Kullanım kılavuzu

AÇIKLAMA
Cavex Bite&White ürününde beyaztaları olarak hidrojen peroksit kullanılmaktadır. Yetersiz karalı bir ürün elde etmek için karbamit peroksit kullanılmıştır. Karbamit peroksit, oksijen radikalleri ve suda çabuk çözünür. Ağartma sürecinde serbest radikaller, diğer bir deyişle dişlerin renklenmesinin kaynağı olan kişi karbon bağlarına saldırır.

AMBALAJ
▪ Cavex Bite&White şırıngalar (3 ml)

FORMÜLÜ
Mürekkep:
▪ 16 % karbamit peroksit – %6 hidrojen peroksite eşittir.
▪ 0,2 % hassasiyet giderici potasyum nitrat
▪ 0,1 % hassasiyet giderici sodyum florür

KULLANIM ENDİKASYONLARI
Cavex Bite&White doğal olan dişlerin rengini açmak için kullanılan bir beyaztlama ürünüdür. Cavex Bite&White, sadece diş hekimi tarafından veya onun talimatıyla 18 yaşından büyük kişiye temin edilebilir. Herhangi bir beyaztatma işleminden önce, ağız ya da genel sağlığınızla ilgili sorunları engellemek için yetkili diş hekimine muayene olunması tavsiye edilir.

KONTRENDİKASYONLARI
Aşağıda kişilerin işlemden önce bir doktora danışılması tavsiye edilir:
▪ Hamile bayanlar ve emziren anneler.
▪ Ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi görenler

KLİNİK PROSEDÜR
▪ Başlangıç rengini kayıt altına alın. Mevcut diş sağlığını inceleyin. Ayrıca hedefinin ideal olmadığı ve gerçekçi olmayan beklentilerinin olmadığından emin olun.
▪ Kompozit veya porlakorbanat materyalleri etkilenmeden ayrılan kalıkrem, geçici restorasyonlar beyaztatma prosedürü esnasında renk değişterdiki. Bu sebeften mülğıen bir bıyas ut, ellersom endast naturliga tänder blir vitare.
▪ Vänta 2 veckor efter den senaste restaureringen med kompositfyllningar att färgen kan stabiliseras, då det gäller patienter som behöver en estetisk behandling eller en behandling med tandemedel. Alla lagningar ska vara intakta och väl applicerade med de rätta tillfälliga materialen.
▪ Det är tillrådligt att använda en produkt för känsliga tänder 2 veckor före och 2 veckor efter behandlingen.
▪ Varna alltid patienten att det kan uppstå känslighet i tänderna eller irritation i tandköttet under behandlingen. Tandköttet som kommer i kontakt med produkt kan bli rött eller vitt, men återtar efter några dagar sin normala färg.
▪ Ge patienten råd att inte tillägga gel för mycket gel i skenan för att undvika irritation av mjuk vävnad och att avlägsna överflödigt gel på gränsen till tandköttet och att skölja munnen ordentligt efter behandlingen.
▪ Påpeka för patienten att skruva på locket på sprutan efter varje behandling.
▪ Patienten bör inte äta, dricka eller röka efter varje behandling under minst 60 minuter.
▪ Instruera patienten att stoppa behandlingen och omedelbart kontakta er om det uppstår något problem.
▪ Den slutliga färgen framträder ca. 2 veckor efter behandlingens början.

UYARILAR
▪ Flüor içerir.
▪ Hidrojen peroksit içerir.
▪ Göze temas etmesinden kaçının.
▪ Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.
▪ Hassas dişlerde uygulanmayın.
▪ Dolu dişli kaşığı ağzınızda iken gıda vb. tüketmeyin ve sigara kullanmayın.
▪ Yutulduğunda zararlıdır.

İLK YARDIM TALİMATLARI
▪ Şırınganın içerisindeki jelin %'inden fazlasının yutulması durumunda derhal su içmiz, zorla istifra edilmesine ve bir hekime danışılmalıdır.
▪ Jelin göz ile teması durumunda gözkapaklarını açıp gözü en az 15 dakika boyunca su ile yıkamak ve bir hekime danışmak gerekir.
▪ Elbiselerinize, saçınıza veya kyaklarınıza bulaşırsa, kıyafetlerizi çıkartın, tenizdi yada saçınızı suyun altına tutun.

OLUŞABİLECEK OLUMSUZ ETKİLER
Cavex Bite&White'ın kullanımı ile ilgili olarak oluşabilecek olumsuz etkiler aşağıda belirtilmiştir, ancak aşağıda belirtilmemiş etkiler olabilir:

Hassasiyet
Bazı hastalar tedavi esnasında dişlerinde soğuğa karşı aşırı hassasiyet hissedebilirler. Diğerlerinde ise dişlerde, diş etlerinde, dilde, dudaklarda veya boğazda hassasiyet gözlenilir. Genelde bu belirtiler tedavinin sona erdiğinden kısa bir süre sonra ortadan kaybolur. Hedeflenen beyaztığa ulaşılana kadar tedaviye seans sayısını düşürerek ve seans sürelerini kısaltarak devam edilebilir. Şikayetler devam ederse, tedaviyi sonlandırmak gerekir.

Dişeterlerine tahriş
Çoğu kişiden dişeterine kadar ulaşırsa, yumuşak dokuda hafif ya da ciddi tahriş oluşabilir.
Şayet diçi kişiğiden dişeterine tam oturuyorsa, hastanın doğru miktarda ürünü doğru yolla uygulayıp uygulamadığını kontrol ediniz. Hastanın dişçi kaşığındaki jel miktarını azaltması gerekebilir.

DEPOLAMA TAVSİYELERİ
▪ Buzdolabında (+8°C) ışıktan korunyarak kuru yerde muhafaza edin.
▪ Son kullanma tarihi geçen ürünü kullanmayın.

İMHA
▪ Ürünü yerel atık yönetmeliklerine göre imha edinız.

Hollanda'da imal edilmiştir.

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdiğimiz teknik tavsiyeler güvenle ancak garanti verilmeden yapılmıştır, ve bu ayrı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği hakkını da kapsar. Bu bizi belirtilen prosesler ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünleri test etmek zorunluluğundan uzaklaştırmaz.
Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve prosesleri bizim kontrolümüzün dışındadır ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluğa rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malların değerleriyle limitli olacaktır. Tabi ki, ürünlerimizin uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarımızın içinde sağlayacağız.

GR Οδηγίες χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο λευκαντικός παράγοντας στο Cavex Bite&White είναι το υπεροξείδιο υδρογόνου. Προστίθεται ως υπεροξείδιο καρβαμίδιου για την επίτευξη ενός ελαφρώς σταθερού προϊόντος. Το υπεροξείδιο του καρβαμίδιου διασπάται γρήγορα σε ρίζες οξυγόνου και νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, οι ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τις διπλοφορείς ενώσεις, οι οποίες είναι συνήθως υπεύθυνες για τον σπιχρωματισμό των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
▪ Σύριγγες Cavex Bite&White 3 ml

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενεργά συστατικά:
▪ 16 % υπεροξείδιο καρβαμίδιου – ισοδύναμο με 6 % υπεροξείδιο υδρογόνου
▪ 0,2 % αποευαισθητοποιητής νιτρικού καλίου
▪ 0,1 % αποευαισθητοποιητής φθορούχου νατρίου

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Cavex Bite&White είναι ένα λευκαντικό προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λευκάνση δοντιών φυσικού χρώματος. Το Cavex Bite&White πρέπει να χορηγείται υπό τον κανονισμό ενός οδοντιάτρου ή με βάση του εντολή σε άτομα άνω των 18 ετών. Πριν από κάθε διαδικασία λεύκανσης συνιστάται να εξετάζεται ο οδοντιατρικός οδοντιάτρο που ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος ή τυχόν ασυμφωνία στοματικού προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πριν πραξουν συνιστάται στα παρακάτω πρόσωπα να συμβουλεύονται γιατρό:
▪ Έγκυες και θηλαζούσες
▪ Πρόσωπα που υποβάλλονται σε θεραπεία για σοβαρή ασθένεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
▪ Καθορίστε το χρώμα εκκίνησης, εκτιμήστε την τωρινή υγεία της οδοντοστοιχίας και φροντίστε να είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες του ασθενούς για το τελικό αποτέλεσμα.
▪ Προσωρινές ή προσωρινές αποκαταστάσεις οδοντοστοιχίας μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, ενώ σύνθετο ή πολυκαρβονικό υλικό δεν θα επηρεαστεί. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς αποκατάστασεις σύνθετου υλικού ότι υπάρχει σύνθετο υλικό σε πρέπει να αντικατασταθεί, δεδομένου ότι μόνο τα φυσικά δόντια γίνονται λευκότερα.
▪ Περίμενε 2 λεπτά ύστερα από τη θεραπεία ή 2 εβδομάδες μετά τη λευκάνση βαθιάς λεύκανσης, ώστε η χρωματικός τόνος να σταθεροποιηθεί. Αυτό θα βοηθήσει τους ασθενείς με τη μόνιμη αποκατάσταση. Ο χρωματισμός θα μείνει σταθερός μόνο σε φυσικά δόντια. Εάν υπάρχουν ορατές ή κακά σφραγισμένες μη σε σωστά προσωρινά υλικά.
▪ Πρέπει να συνιστάται η χρήση ενός πρόσλυσης για ευαίσθητα δόντια, επί 2 εβδομάδες πριν από τη διαδικασία λεύκανσης μέχρι 2 εβδομάδες μετά την εν λόγω διαδικασία.
▪ Πρέπει να ενδιαφέρει πάντα τον ασθενή για ευαισθησία των δοντιών ή ερεθισμό ούλα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το ούλο που έρχεται σε επαφή με το υλικό μπορεί να γίνει κόκκινο ή λευκό, αλλά ανακτά το φυσιολογικό χρώμα του μετά από μερικές ημέρες.
▪ Ενθαρρύνετε τον ασθενή - προς πρόληψη ερεθισμού του μαλακού ιστού - να μη γεμίζει υπερβολικά τα δοντάκια, να σκουπίζει το ή/και που περισσεύει στη γραμμή του ούλου και νεκρώνεται πολύ καλά στο στόμα του μετά τη διαδικασία.
▪ Επιπρόσθετα στον ασθενή ότι, μετά από κάθε διαδικασία, πρέπει να επανατοποθετεί το κοπτικό σωληνάριο.
▪ Ο ασθενής δεν επιτρέπεται να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει επί 60 λεπτά τουλάχιστον μετά τη θεραπεία.
▪ Πείτε στον ασθενή να σταματήσει τη θεραπεία και να έρθει αμέσως σε επαφή μαζί σας εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
▪ Το τελικό χρώμα επιτυγχάνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
▪ Περιέχει φθορούχο άλας
▪ Περιέχει υπεροξείδιο υδρογόνου.
▪ Να αποφεύγετε επαφή με τα μάτια.
▪ Να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά.
▪ Μη τοποθετείτε