CAVEX Bite&White

PATIENT TOOTH WHITENING INSTRUCTIONS

Quick Reference Chart

	1	2	3	4
NL	Poets het gebit grondig	Breek het dopje van de spuitfles	Doseer 1 druppel per tand in de kepel	Breng de bleekgel aan in de mond
D	Das Gebiss gründlich putzen	Die Spitze der Dosierspritze abbrechen	Pro Zahn 1 Tropfen in den Löffel geben	Den Bleichöffel im Mund anbringen
FR	Lavez-vous soigneusement les dents	Cassez l'embout à l'extrémité de la seringue	Versez 1 goutte par dent dans la gouttière	Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche
GB	Brush your teeth thoroughly	Break the cap off the topsite	Administer 1 drop per tooth into the tray	Insert the bleaching tray into your mouth
I	Lavarsi bene i denti	Rompere il cappuccio della siringa	Mettere 1 goccia di prodotto per ogni cavità dentale della mascherina	Inserire la mascherina sulla apposita arcata
E	Cepillese los dientes a fondo	Rompa el tapón de la punta dispensadora	Dosifique 1 gota por diente en la cubeta	Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca
HR	Temeljito operite zube	Odlomite vrh štrcaljke	Nanesite 1 kap po zubu na udlagu	Umetnite udlagu sa sredstvom za izbjeljivanje u usta
DK	Børst tænderne grundigt	Bræk hætten af sprøjtespidsen	Dryp en dråbe pr. tand i skeen	Sæt blegeskeen på tænderne
H	Mossa meg alaposan a fogát	Törje le a fecskendőtubus kupakját	Tegyen fogankként egy cseppet a tálcába	Helyezze a fehérítőtálcát a szájába
PL	Zęby należy dokładnie umyć	Należy odłamać nakrętkę ze szpicu	Dozować 1 kroplę na ząb do łyżeczki	Wprowadź łyżeczkę wybielającą do jamy ustnej
P	Escove muito bem os dentes	Quebre a tampinha do bico aplicador	Aplique 1 gota por dente no molde	Introduza o molde de branqueamento na boca
S	Borsta tänderna noga	Bryt av hatten från sprutspetsen	Droppa 1 droppe per tand i skeden	För blekningsskenan med tanden
TR	Dişlerinizi iyice fırçalayın	Tüpün ucunu çıkatarak tüpün açılmasını sağlayın	Her diş için dış kalıbına birer damla Cavex Bite dağıtın	Dış kalıbını ağzınızın içerisine yerleştirin.
GR	Βουρτσίστε πολύ καλά τα δόντια	Σπάστε το πώμα του στομίου	Βάλτε το σύνολο 1 σταγόνα από δόση ανα κατσαρολα	Βάλτε το δίσκάρπο λεύκανσης στο στόμα
RUS	Тщательно почистите зубы	Отломите наконечник аппликатора	Нанесите по 1 капле на каждый отпечаток	Наденьте капу для отбеливания на зубы
CN	将牙齿刷洗刷干净	打破注射筒尖端的小帽	在擦拭牙套内为每一颗牙齿上一滴	将擦白牙套放入口腔
KOR	치아를 구석구석 깨끗하게 닦으십시오.	투여팁을 자르십시오	트레이에 치아당 1방울씩 미백제를 투여하십시오.	미백트레이를 입안에 넣으십시오.
SA	نظف أسنانك بعناية وبالفرشة	اكسر غطاء الحقنة	ضع مقدار قطرة واحدة لكل سن على الغلاف	ضع حافظة علاج البياض في فمك

	5	6	7	8
NL	Bleek gedurende minimaal 1 uur	Spoel de mond met water	Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden	Reinig de bleekgels met uw tandenborstel
D	Mindestens 1 Stunde bleichen	Den Mund mit Wasser ausspülen	Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen	Die Bleichöffel mit der Zahnbürste reinigen
FR	Laissez agir pendant au moins 1 heure	Rincez-vous la bouche à l'eau	Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement	Nettoyez les gouttières de blanchiment avec votre brosse à dents
GB	Bleach for at least one hour	Rinse your mouth with water	Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully	Clean the bleaching tray with your toothbrush
I	Lasciare agire per almeno 1 ora	Risciacquare la bocca con acqua	Attendere almeno mezzora e lavarsi i denti con delicatezza	Pulire le mascherine con lo spazzolino da denti
E	Blanquee los dientes al menos durante 1 hora	Enjuáguese la boca con agua	Espere al menos 0,5 hora y cepillese los dientes suavemente	Limpie las cubetas de blanqueamiento con el cepillo de dientes
HR	Trajanje postupka izbjeljivanja: minimalno sat vremena	Isperite usta vodom	Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube	Očistite udlagu valom četkicom za zube
DK	Bleg i minimum 1 time	Skyl munden med vand	Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt	Rengør blegeskeen med tandbørsten
H	Legalább 1 óráig fehérítsen	Öblítse ki a szájját vízzel	Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mossa meg a fogát	Tisztítsa ki a tálcát a fogkefével
PL	Zęby należy wybielać przez przynajmniej godzinę	Spłukać jamę ustną wodą	Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby	Łyżeczki do bielenia należy umyć szczoteczką do zębów
P	O tempo de embranquecimento deve ser no mínimo 1 hora	Enxague a boca com água	Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes	Limpe os moldes de branqueamento com a sua escova de dentes
S	Blek tänderna under minst 1 timme	Skölj munnen med vatten	Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt	Rengör bleknings skenorna med handen
TR	Diş beyazlatma işlemini en az bir saat sürdürün	Ağzınızı su ile çalkalayın	En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice dişlerinizi fırçalayın	Ağız tası ile çalkalayın
GR	Λευκάνετε επί 1 ώρα τουλάχιστον	Ξεπλύνετε τη στόμα με νερό	Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βουρτσίστε έπειτα προσεχτικά τα δόντια	Να καθαρίζετε τα δισκάρια λεύκανσης με την οδοντόβουρτσά σας
RUS	Процедуру отбеливания продолжать не менее часа	Прополощите рот водой	По истечении не менее получаса осторожно почистьте зубы	Очистите капу для отбеливания зубной щеткой
CN	持续漂白至少 1 小时	用水漱口	等候至少半小时，然后小心地刷牙	用牙刷清洗漂白牙套
KOR	미백이 진행되기까지 적어도 1시간 이상 기다리세요.	물로 입을 헹궈라.	30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 하라.	칫솔로 미백트레이를 깨끗이 닦는다.
SA	اتركه يعمل لمدة لا تقل عن ساعة	اشطف الفم بالماء.	انتظر نصف ساعة على الأقل ثم نظف أسنانك بحرص بالفرشة	نظف حافظة علاج اللون بفرشة أسنانك

CAVEX Bite&White

PATIENT TOOTH WHITENING INSTRUCTIONS

NL Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING
Waterstofperoxide dient als bleekmiddel in Cavex Bite&White. Het wordt toegevoegd als carbamideperoxide om een voldoende stabiel product te verkrijgen. De carbamideperoxide laat snel zuurstof vrij en zuurstofradicalen en water. Tijdens het bleekproces vallen de vrije radicalen de dubbele koolstofverbindingen aan; deze vormen meestal de bron van tandverkleuring.

VERPAKKING
- Cavex Bite&White spuiten (3 ml)

SAMENSTELLING
Actieve bestanddelen:
- 16 % carbamideperoxide – gelijk aan 6 % waterstofperoxide
- 0,2 % kaliumnitraat-Desensitizer
- 0,1 % natriumfluoride-desensitizer

INDICATIES VOOR GEBRUIK
Cavex Bite&White is een whitening product om de kleur van natuurlijke tanden lichter te maken. Cavex Bite&White mag alleen door of in opdracht van een tandheelkundige worden verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Een consult bij een bevoegde tandarts vóór elke bleekbehandeling wordt aanbevolen om mond- of gezondheidsproblemen uit te sluiten.

CONTRA-INDICATIES
Onderstaande personen wordt geadviseerd voorafgaand aan de behandeling een arts te raadplegen:
- Zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven.
- Personen die worden behandeld voor een ernstige ziekte.

KLINISCHE PROCEDURE
- Leg de uitgangskleur vast, evalueer de huidige gezondheid van het gebit en zorg er voor dat alle vullingen aan de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisionische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composieten of polycarbonaat materiaal niet wordt beïnvloed. Daarom dient aan patiënten met composietrestauraties te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden zullen verkleuren.
- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben, 2 weken na de laatste bleekbehandeling, de kleur kan zich dan stabiliseren. Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed geseald met de juiste tijdelijke materialen.
- Het gebruik van een product zonder geschikte kaken, 2 weken voor de behandeling U dient de patiënt altijd te waarschuwen voor gevoeligheid van de tanden of gelmteerd tandwees tijdens de behandeling. Het tandvlees dat met het middel in aanraking komt, kan rood of wit worden, maar neemt na enkele dagen de normale kleur weer aan.
- Adviseer de patiënt - om irritatie van zacht weefsel te voorkomen - om de tray niet te overladen. Als het middel toch wordt aangebracht op tegen aan de grens van het tandvlees en om de mond na de behandeling grondig te spoelen.
- Wijs de patiënt er op het feit dat het bleekmiddel na de behandeling weer op de spuit moet worden geplaatst.
- De patiënt mag minstens 60 minuten na elke behandeling niet eten, drinken of roken.
- Instrueer de patiënt om de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact met u op te nemen als zich een probleem voordoet.
- De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin van de behandeling tot stand.

WAARSCHUWINGEN
- Bevat fluoride.
- Bevat waterstofperoxide.
- Vermijd contact met de ogen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het dragen van de gevulde op maat gemaakte trays.
- Gevaarlijk bij inslikken.

INSTRUCTIES VOOR EERSTE HULP
- Als een gezwel in de mond (ca. 25% om de gel in de spuit) is ingeslikt: onmiddellijk water drinken, braken niet opwekken en een arts raadplegen.
- Indien er gel in de ogen komt: ogen grondig spoelen met water. Als nog minstens 15 minuten achter elkaar met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij contact met kleding, huid of haar: aangetaste kleding verwijderen en huid of haar onder een lopende kraan spoelen.

MOGELIJKE NADELIGE EFFECTEN
Nadelige effecten die kunnen voortkomen uit het gebruik van Cavex Bite&White zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

Gevoeligheid
Sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling een toegenomen gevoeligheid van de tanden voor kou ervaren; anderen kunnen een niet-specifieke gevoeligheid ervaren in tanden, tandvlees, long, lippen of keel. In het algemeen dienen de symptomen enkele dagen na beëindiging van de behandeling te verdwijnen. De behandeling kan worden voortgezet met kortere, minder frequente applicaties totdat het gewenste effect is bereikt. Als het ongemak blijft, dient de behandeling te worden beëindigd.

Irritatie van het tandvlees
Trays die zich uitstrekken tot het tandvlees, kunnen een matige tot ernstige irritatie van zacht weefsel veroorzaken.
Indien de trays goed passen, controleer dan of de patiënt de correcte hoeveelheid op de juiste manier verwerkt.
Wellicht dient de patiënt de hoeveelheid gel in de trays te verminderen.

BEWAARADVIES
- Bewaar in de koelkast (<8°C) op een donkere, droge plek.
- Gebruik het materiaal niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

VERWIJDERING
- Verwijder het product conform de lokale afvalregels.

D Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG
Cavex Bite&White enthält das Bleichmittel Wasserstoffperoxid. Um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten, wird dieses als Carbamidperoxid zugesetzt. Carbamidperoxid zerfällt schnell in Sauerstoffradikale Teilchen und Wasser. Beim Bleichen spalten sich die freien radikalen Kohlenstoffverbindungen mit Doppelbindungen, dies ist häufig die Ursache von Zahnverfärbungen.

VERPACKUNG
- Cavex Bite&White Spritzen (3 ml)

ZUSAMMENSETZUNG
Wirkstoffe:
- 16 % Carbamidperoxid – entspricht 6 % Wasserstoffperoxid
- 0,2 % Kaliumnitrat-Desensitizer
- 0,1 % Natriumfluorid-Desensitizer

INDIKATION
Cavex Bite&White ist ein Bleichprodukt zum Aufhellen der Farbe natürlicher Zähne. Cavex Bite&White darf ausschließlich von Zahnmedizinern oder in deren Auftrag und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Um Mund- und Gesundheitsbeschwerden auszuschließen, empfiehlt es sich, vor jeder Bleichbehandlung einen qualifizierten Zahnarzt zu konsultieren.

GEGENINDIKATIONEN
Den nachstehenden Personen wird empfohlen, vor der Behandlung einen Arzt zu konsultieren:
- Schwangeren und stillenden Frauen.
- Personen, die aufgrund einer schweren Krankheit behandelt werden.

KLINISCHES VERFAHREN
- Bestimmen Sie die Ausgangsfarbe, ermitteln Sie den Gesundheitszustand des Gebisses und sorgen Sie dafür, dass der Patient eine realistische Vorstellung vom Endergebnis erhält.
- Die provisorischen Gebissrestaurationen kann es während des Aufhellungsprozesses zu Verfärbungen kommen. Bei Kompositen- oder Polycarbonatmaterial tritt dieser Effekt nicht auf. Patienten mit Kompositrestaurationen sind daher darüber zu informieren, dass diese eventuell ersetzt werden müssen, da nur die natürlichen Zähne weißer werden.
- Bei Patienten, die eine ästhetische oder adhäsive Restauration benötigen, empfiehlt es sich, nach der letzten Bleichbehandlung 2 Wochen zu warten. Die Farbe kann sich dann stabilisieren. Sämtliche Restaurationen müssen intakt oder mit geeigneten provisorischen Materialien versiegelt sein.
- Es könnte zu Überempfindlichkeit der Zähne oder Zahnfleischreizungen kommen, wenn ein Produkt ohne passende Schienen verwendet wird. Nach jeder Behandlung darf der Patient 60 Minuten lang nichts essen und trinken und nicht rauchen.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass Sie Probleme im Behandlung abzubrechen und ein Zahnarzt zu konsultieren ist.
- Die endgültige Farbe stellt sich etwa 2 Wochen nach Beginn der Behandlung ein.

WARNHINWEISE
- enthält Fluorid
- enthält Wasserstoffperoxid
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- außer Reichweite von Kindern halten
- nicht bei überempfindlichen Zähnen verwenden
- nicht essen, trinken oder rauchen, wenn sich die maßgefertigten, gefüllten Schienen im Mund befinden
- gesundheitsschädlich beim Verschlucken

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
- bei Verschlucken größerer Mengen (mehr als 25 % des Inhalts einer Spritze): sofort Wasser trinken, keinen Brechreiz anregen und einen Arzt konsultieren.
- bei Augenkontakt: Augenlider auseinanderziehen, das Auge mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- bei Kontakt mit Kleidung, Haut oder Haaren: Kleidung entfernen, Haut oder Haare mit fließendem Wasser spülen.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN
Bei der Verwendung von Cavex Bite&White können unter anderem die folgenden unerwünschten Nebenwirkungen auftreten:

Empfindlichkeit
Bei einigen Patienten kann es während der Behandlung zu einer gesteigerten Kälteempfindlichkeit der Zähne kommen; bei anderen kann eine unbestimmte Empfindlichkeit von Zähnen, Zahnfleisch, Zunge, Lippen oder Rachen auftreten. In der Regel verschwinden diese Symptome einige Tage nach Beendigung der Behandlung. Die Behandlung kann mit kürzeren und weniger häufigen Anwendungen fortgesetzt werden, bis der gewünschte Bleaching-Effekt erreicht ist. Wenn die Probleme weiterhin auftreten, ist die Behandlung abzubrechen.

Zahnfleischreizungen
Bei Schienen, die das Zahnfleisch berühren, kann es zu mäßigen bis schweren Reizungen des weichen Gewebes kommen.
Vergewissern Sie sich bei gut passenden Schienen, ob der Patient die richtige Menge in der richtigen Weise verwendet.
Eventuell muss die Menge des Gels in Schiene reduziert werden.

AUFBEWAHRUNG
- im Kühlschrank (<8°C) aufbewahren, dunkel und trocken lagern
- nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden

ENTSORGUNG
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.

F Mode d'emploi

DESCRIPTION
Cavex Bite&White contient de l'eau oxygénée en tant qu'agent de blanchiment. Elle est combinée avec l'urée sous forme de peroxyde de carbamide pour plus de stabilité. Le peroxyde de carbamide se dissout rapidement en radicaux d'oxygène et en eau. Pendant le blanchiment, les radicaux libres attaquent les doubles composés de carbone qui sont généralement à l'origine des décolorations des dents.

CONDITIONNEMENT
- Seringues Cavex Bite&White (3 ml)

COMPOSITION
Composants actifs :
- 16 % de peroxyde de carbamide – équivalant à 6 % de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)
- 0,2 % de désensibilisateur au nitrate de potassium
- 0,1 % de désensibilisateur au fluorure de sodium

UTILISATION
Cavex Bite&White est un produit de blanchiment qui est utilisé pour éclaircir la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White doit exclusivement être administré par des dentistes, ou sur leurs instructions, à des personnes âgées de 18 ans ou plus. Il est recommandé de consulter un dentiste agréé avant chaque traitement afin d'exclure tout problème buccale ou sanitaire.

CONTRE-INDICATIONS
Il est recommandé de consulter un médecin dans les cas suivants:
- femmes enceintes et allaitantes.
- personnes traitées pour une maladie grave.

PROCEDURE CLINIQUE
- Déterminez la couleur initiale, évaluez l'état de santé actuel des dents et faites en sorte que les attentes du patient concernant le résultat final soient réalistes.
- Les restaurations provisoires ou temporaires de la dentition peuvent se décolorer pendant le blanchiment alors que les matériaux en composite ou polycarbonate n'en sont pas affectés. C'est pourquoi les patients concernés doivent être informés que les composites devront peut-être être remplacés étant donné que le blanchiment n'est efficace que sur les dents naturelles.
- Pour les patients ayant besoin d'une restauration esthétique ou adhésive, attendez 2 semaines après le dernier blanchiment afin que la couleur puisse se stabiliser. Toutes les restorations doivent être intactes ou bien scellées avec les matériaux provisoires adaptés.
- Il convient de recommander d'utiliser un dentifrice pour dents sensibles 2 semaines avant le traitement et jusqu'à 2 semaines après.
- Avertissez toujours le patient que ses dents seront sensibles ou ses gencives irritées pendant le traitement. Les gencives en contact avec le produit peuvent rougir ou blanchir, mais reprennent leur couleur normale au bout de quelques jours.
- Conseillez au patient – pour éviter d'irriter les tissus mous - de ne pas surcharger la tablette, d'éliminer l'excès de gel en bordure des gencives et de bien rincer la bouche après le traitement.
- Précisez au patient qu'il faut toujours remettre le capuchon sur la seringue après chaque traitement.
- Le patient ne doit pas manger, boire ni fumer pendant au moins 60 minutes après chaque traitement.
- Demandez au patient d'interrompre le traitement et de vous contacter immédiatement en cas de problème.
- La couleur finale apparaît 2 semaines environ après le début du traitement.

AVERTISSEMENTS
- Contient du fluorure.
- Contient du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).
- Evitez tout contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité des dents.
- Ne pas manger, boire ni fumer pendant le port de la tablette garnie sur mesure.
- Danger en cas d'ingestion.

PREMIERS SECOURS
- Si une quantité importante (plus de 25 % du gel contenu dans la seringue) a été ingérée : boire de l'eau immédiatement, ne pas provoquer de vomissement et consulter un médecin.
- Si le gel entre en contact avec les yeux : écarter les paupières, rincer l'oeil à l'eau pendant au moins 15 minutes consécutives et consulter un médecin.
- En cas de contact avec les vêtements, la peau ou les cheveux : retirer les vêtements touchés et rincer la peau ou les cheveux à l'eau courante.

EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES
Les effets indésirables pouvant être liés à l'utilisation de Cavex Bite&White sont notamment les suivants :

Sensibilité
Certains patients peuvent présenter pendant le traitement une sensibilité accrue des dents au froid. D'autres une sensibilité non spécifique des dents, des gencives, de la langue, des lèvres ou de la gorge.
D'une manière générale, les symptômes doivent disparaître quelques jours après la fin du traitement. Le traitement peut être poursuivi avec des applications plus brèves et moins fréquentes jusqu'à ce que le degré de blanchiment souhaité soit atteint. Si la gêne subsiste, le traitement doit être arrêté.

Irritation des gencives
Les tablettes qui s'étendent jusqu'aux gencives peuvent provoquer des irritations modérées à graves des tissus mous.
Si les tablettes s'ajustent bien, vérifiez que le patient applique correctement la bonne quantité.
Le patient devra peut-être réduire la quantité de gel dans les tablettes.

CONSEIL DE CONSERVATION
- Conserver au réfrigérateur (<8°C) dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- Ne pas utiliser après la date limite de conservation.

DECHETS
- Jeter le produit conformément aux consignes locales en matière de déchets.

GB Instructions for use

DESCRIPTION
Hydrogen peroxide is the bleaching agent in Cavex Bite&White. It is added as carbamide peroxide in order to obtain a sufficiently stable product. The carbamide peroxide breaks down rapidly into oxygen radicals and water. During the whitening process the free radicals attack the double carbon bonds that are the source of most colours (stains) in the tooth.

PACKAGING
- Cavex Bite&White 3 ml syringes

COMPOSITION
Active ingredients:
- 16% Carbamide Peroxide – equivalent to 6% Hydrogen Peroxide
- 0.2% Potassium nitrate Desensitizer
- 0.1% Sodium fluoride Desensitizer

INDICATIONS FOR USE
Cavex Bite&White is a whitening product used to lighten the colour of natural teeth. Cavex Bite&White should only be dispensed by or on the order of a dental professional to people over the age of 18. A consultation with a qualified dentist is recommended before beginning the whitening procedure to check for any underlying oral or health issues.

CONTRAINDICATIONS
Any patient falling into one of the categories below is advised to consult a doctor prior to starting the treatment:
- Pregnant and lactating women.
- Those currently being treated for a serious illness.

CLINICAL PROCEDURE
- Record starting shade, review current dental health and make sure patient has realistic expectations about the final results.
- Provisional or temporary restorations may discolour during the whitening process while composite or polycarbonate materials will remain unaffected. Therefore, patients with composite restorations must be advised that existing composites may require replacement, since only natural teeth will whiten.
- For patients requiring aesthetic or adhesive restorations, wait 2 weeks after the last whitening treatment to allow for colour stabilization. All restorations should be intact or well sealed with adequate temporary materials.
- The use of a sensitivity relief product starting 2 weeks prior to the treatment procedure until 2 weeks after the treatment should be advised.
- Patients should always be warned of tooth sensitivity or gingival irritation during the treatment. The gingival areas that come in contact could turn red or white but will return to its normal colour after several days.
- To avoid soft tissue irritation, advise the patient to avoid overfilling trays, to wipe away any excess gel from the gum line and to rinse the mouth thoroughly after the treatment.
- Advise patient to always place used trays in the syringe cap.
- The patient should not eat, drink or smoke tobacco for at least 60 minutes after each treatment.
- Instruct the patient to stop the treatment and contact you immediately if any problem develops.
- The final shade will be achieved about 2 weeks after the start of the treatment.

WARNINGS
- Contains Fluoride.
- Contains Hydrogen Peroxide.
- Avoid contact with eyes.
- Keep out of reach of children.
- Do not use if hypersensitive teeth.
- Do no eat, drink or smoke while wearing the filled custom-fitted trays.
- Harmful when swallowed.

FIRST AID INSTRUCTIONS
- If a large quantity (over 25% of the gel in the syringe) is swallowed, immediately drink water, do not induce vomiting and consult a physician.
- If gel gets into eyes, hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water for at least 15 minutes and contact a doctor.
- If clothing, skin or hair comes in contact with gel, remove contaminated clothing and flush skin or hair with running water.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS
Adverse effects that may be associated with the use of Cavex Bite&White include, but are not limited to:

Sensitivity
Some patients may experience increased tooth sensitivity to cold during the treatment, while others may have non-specific sensitivity in their teeth, gums, tongue, lips or throat.
In general symptoms should disappear within several days after the treatment is stopped. The treatment can be proceeded with shorter, less frequent applications until the desired whitening effect has been achieved. If the discomfort remains, discontinue treatment.

Gingival Irritation
Trays that extend onto the gingiva may cause mild to severe soft tissue irritation.
If the trays fit properly, check if the patient applies the proper quantity in the proper way.
The patient may need to reduce the amount of gel in their trays.

STORAGE ADVICE
- Store refrigerated (<8°C) in a dark, dry place.
- Do not use the material after the expiry date.

DISPOSAL
- Dispose of device in accordance with local waste regulations.

I Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE
L'acqua ossigenata è l'agente sbiancante contenuto in Cavex Bite&White e viene aggiunto sotto forma di perossido di carbammide. A sua volta, il perossido di carbammide si decompone rapidamente in radicali dell'ossigeno e acqua. Durante il processo di sbiancamento, i radicali liberi attaccano i legami doppi di carbonio, che sono la causa più sul pericolo di colorazione dei denti.

CONFEZIONE
- Cavex Bite&White siringhe (93 ml)

COMPOSIZIONE
Sostanze attive:
- 16% di perossido di carbammide – equivalente al 6% di acqua ossigenata
- 0,2 % di nitrato di potassio - desensibilizzante
- 0,1% di fluoruro di sodio - desensibilizzante

INDICAZIONI PER L'USO
Cavex Bite&White è un prodotto sbiancante per schiarire il colore dei denti naturali. Cavex Bite&White può essere distribuito solamente da o su richiesta dei dentisti a persone di età superiore ai 18 anni. Prima di ogni trattamento sbiancante, si consiglia di consultare un dentista per accertare l'assenza di problemi di salute o del cavo orale.

CONTROINDICAZIONI
Si consiglia di consultare un medico prima del trattamento a:
- donne in gravidanza e durante l'allattamento.
- persone sottoposte a terapia per malattia grave.

PROCEDURA CLINICA
- Definire il colore di partenza, valutare la salute attuale dei denti e assicurarsi che il paziente abbia aspettative realistiche riguardo il risultato finale.
- Durante lo sbiancamento, le restorazioni provvisori o temporanee possono scolorire, mentre il prodotto non avrà alcuna influenza su materiale composito o policarbonato. Per questo motivo, è necessario informare i pazienti con restauri effettuati con materiali compositi, che i compositi attuali dovranno probabilmente essere sostituiti, in quanto possono essere sbiancati solo i denti naturali.
- Nel caso di pazienti che necessitano di restauri estetici o adesivi, attendere due settimane dopo l'ultimo trattamento, in quanto occorre il colore può stabilizzarsi. Tutti i restauri devono essere integri, o ermeticamente sigillati con materiali provvisori.
- Si deve consigliare l'uso di un prodotto per denti sensibili, da 2 settimane prima del trattamento fino a 2 settimane dopo.
- Si deve sempre avvertire il paziente che durante il trattamento i denti diventeranno sensibili e che le gengive potrebbero irritarsi. La gengiva che viene a contatto con il prodotto può diventare rossa o bianca, ma dopo qualche giorno, riprende il suo colore naturale.
- Per prevenire l'irritazione dei tessuti molli, consigliare al paziente di non sovracaricare il portaimpronta, togliere il gel in eccesso lungo il bordo della gengiva e sciacquare bene la bocca dopo il trattamento.
- Fare presente al paziente che, dopo ogni trattamento, occorre chiudere la siringa con l'apposito tappo.
- Dopo ogni trattamento, per almeno 60 minuti il paziente non deve mangiare, bere o fumare.
- Qualora si dovessero verificare problemi Indicare al paziente di interrompere il trattamento.
- Il colore finale si ottiene circa 2 settimane dopo l'inizio del trattamento.

AVVERTENZE
- Contiene fluoro.
- Contiene acqua ossigenata.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non applicare su denti ipersensibili.
- Durante l'applicazione, non mangiare, bere, né portaimpronta non mangiare, bere o fumare.
- Prodotto pericoloso se ingerito.

ISTRUZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO
- In caso di ingestione di una grande quantità (più del 25% del gel contenuto nella siringa), bere immediatamente acqua; non indurre il vomito e contattare un medico.
- Se il gel viene a contatto con gli occhi: aprire le palpebre, sciacquare gli occhi per almeno 15 minuti senza interruzione e consultare un medico.
- In caso di contatto con indumenti, la pelle o i capelli: togliere gli abiti e sciacquare la pelle o i capelli con acqua corrente.

POSSIBILI EFFETTI NOCIVI
Gli effetti indesiderati dei possibili effetti nocivi che possono essere correlati all'uso di Cavex Bite&White:

Sensibilità
Durante il trattamento, alcuni pazienti possono notare un aumento della sensibilità dei denti al freddo; altri possono manifestare una sensibilità non specifica dei denti, delle gengive, della lingua, delle labbra o della gola.
In generale i sintomi scompariranno entro qualche giorno dall'interruzione del trattamento. Si può continuare il trattamento con applicazioni più brevi e meno frequenti, fino a ottenere l'effetto desiderato. Se il fastidio persiste interrompere definitivamente il trattamento.

Irritazione delle gengive
I portaimpronta che coprono le gengive possono provocare un'irritazione moderata o grave dei tessuti molli. Qualora i portaimpronta siano della misura giusta, controllare che il paziente adoperi la corretta quantità di gel seguendo le indicazioni d'uso; probabilmente il paziente dovrà utilizzare una quantità minore di gel.

CONSIGLIO PER LA CONSERVAZIONE
- Conservare in frigorifero (<8°C), in un luogo asciutto e buio.
- Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.

SMALTIMENTO
- Smaltire il prodotto conformemente alle regole vigenti a livello locale.

E Instrucciones de uso

DESCRIPCION
El peróxido de hidrógeno es el agente blanqueador que contiene Cavex Bite&White. Se añade como peróxido de carbamida para conseguir un producto suficientemente estable. El peróxido de carbamida se disuelve con rapidez en los radicales del oxígeno y en el agua. Durante el proceso de blanqueo los radicales libres atacan los enlaces dobles del carbono, que son la fuente de la mayoría de colores (manchas) en los dientes.

ENVASE
- Jeringas de 3 ml Cavex Bite&White

COMPOSICION
Ingredientes activos:
- 16 % Peróxido de Carbamida – equivalente a 6 % de peróxido de hidrógeno
- 0,2 % Desensibilizante nitrato de potasio
- 0,1 % Desensibilizante fluoruro de sodio

INDICACIONES PARA EL USO
Cavex Bite&White es un producto de blanqueamiento dental que aclara el color de piezas dentales naturales. Cavex Bite & White solo debe suministrarse por o por orden de un odontólogo a personas mayores de 18 años. Antes de cada tratamiento de blanqueamiento se recomienda consultar a un odontólogo calificado para descartar problemas orales o de salud.

CONTRAINDICACIONES
Se recomienda a las siguientes personas consultar a un médico antes de iniciar el tratamiento:
- Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
- Personas en tratamiento por una enfermedad grave.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO
- Se debe establecer el color de los dientes antes de iniciar del tratamiento, evaluar el estado de salud dental actual y asegurarse que el paciente tiene expectativas reales acerca de los resultados finales.
- Las restauraciones provisionales o temporales pueden decolorarse durante el proceso de blanqueamiento, aunque los materiales de composite o policarbonato no se verán afectados. Por tanto, se debe informar a los pacientes que tengan restauraciones con composite sobre la necesidad de cambiar los composites existentes porque únicamente se blanquearán los dientes naturales.
- Para los pacientes que necesiten una restauración estética o adhesiva, esperar dos semanas después del último tratamiento de blanqueamiento para permitir la estabilización del color. Todas las restauraciones deben estar intactas o bien selladas con los materiales provisionales adecuados.
- Se recomienda utilizar un producto para dientes sensibles 2 semanas antes y hasta 2 semanas después del tratamiento.
- Se debe advertir siempre al paciente sobre la sensibilidad de los dientes o irritación gingival durante el tratamiento. Las áreas gingivales que entren en contacto pueden tornarse rojas o blancas pero retornarán a su color normal después de varios días.
- Para evitar irritación del tejido blando, se debe advertir al paciente que evite sobrellenar las cubetas, limpiar los excesos de gel de la línea de la encía y enjuagar abundantemente la boca después del tratamiento.
- Después de cada tratamiento, asegúrese que el paciente coloque de nuevo la tapa de la jeringa. recordar al paciente que vuelva a poner el tapón en la jeringa tras cada aplicación.
- El paciente no debe comer, beber ni fumar por lo menos hasta 60 minutos después del tratamiento.
- Instruya al paciente para detener el tratamiento y contactarlo inmediatamente si se desarrolla algún problema.
- El color final se logrará alrededor de 2 semanas después de iniciar el tratamiento.

ADVERTENCIAS
- Contiene fluor.
- Contiene peróxido de Hidrógeno.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar la exposición de dientes hipersensibles conocidos.
- No se debe comer, beber ni fumar mientras se llevan las cubetas individuales con un molde.
- Nocivo cuando se ingiere.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Si se ingiere una gran cantidad de producto (más del 25% del gel que contiene la jeringa), beber agua inmediatamente, no inducir vómito, y ponerse en contacto con un médico.
Si el gel entra en contacto con los ojos, sostenga los párpados separados y enjuague el ojo continuamente con agua corriente por lo menos 15 minutos y póngase en contacto con un médico.
En caso de contacto con la ropa, la piel o el cabello, quítese la ropa contaminada y enjuague la piel o el cabello con agua corriente.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos que se pueden asociar con el uso de Cavex Bite&White incluyen, pero no están limitados a:

Sensibilidad
Algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad incrementada del diente al frío durante el tratamiento, mientras que otros pueden tener sensibilidad no específica en sus dientes, encías, lengua, labios o garganta.
En general los síntomas deben desaparecer dentro de varios días después que se interrumpa el tratamiento. Se puede reanudar el tratamiento con aplicaciones más cortas, menos frecuentes hasta que se haya logrado el efecto de blanqueamiento deseado. Si el malestar persiste, interrumpir el tratamiento.

Irritación Gingival
Las cubetas que se extienden hasta la encía pueden ocasionar irritación del tejido blando de moderada a severa. Si las cubetas adaptan adecuadamente, verifique si el paciente aplica la cantidad correcta en forma apropiada. El paciente puede necesitar reducir la cantidad de gel en sus cubetas.

**CONSEJOS DE ALMACENAMIENT

CAVEX BiteWise PATIENT TOOTH WHITENING INSTRUCTIONS

(H) Használati utasítás

LEÍRÁS
A Cavex Bite&White fogfehérítő hatóanyaga a hidrogén-peroxid, melyet a megfelelő stabilitás érdekében karbamid-peroxid formájában tartalmaz a termék. A karbamid-peroxid szabad gyökök formájában oxigénre és a nitrogénre bomlik. A felhelyezés során a szabad gyökök megtámadják a kettős szénkötéseket, melyek azokban a festékszemcsékben találhatók, amik többnyire a fogeltávolítás fontását jelentik.

CSOMAGOLÁS
■ Cavex Bite&White feszkendőtubus (3 ml)

ÖSSZETÉTEL
Aktív hatóanyagok:
16 % hatóanyag-peroxid – mely 6 % hidrogén-peroxidnak felel meg
6 % nátrium-nitrát-dezenzibilizátor
0,1 % nátrium-fluorid dezenzibilizátor

HASZNÁLATI JAVASLATOK
A Cavex Bite&White egy olyan fogfehérítő zselé, melynek használata során a természetes fogak szine fehérebbé lesz. A Cavex Bite&White fogfehérítő csak fogkrémek után használható. Cavex Bite&White részére ilyet ajánlunk: a fogfehérítés kezelés megkezdése előtt javasoljuk, hogy kérje fogorvos tanácsát az esetleges szájb., vagy egyéb egészségügyi problémák megoldása érdekében.

ELLENJAVALLATOK
Allábbiakban javasoljuk, hogy a kezelés előtt kérjék orvos tanácsát:
terhes és szoptató nők.
súlyos betegség miatt kezelt személyek.

KLINIKAI ELJÁRÁS
Jegyezze fel (lényképezze) és a kiindulási szint, vizsgálja meg a fogazat jelenlegi állapotát és gondosan gyógyítsa ani, hogy a páciensnek reális elvárása legyenek a végeredményt illetően.
Az ideiglenes helyreállítások a fehérítés folyamata során elszínezıdhetnek, még a szer a kompozit, vagy polikarbonát alapú anyagokra nincs hatással. Ezért a kompozit-restaurációról rendelkező pácienseket tájékoztatni kell, hogy a meglévő kompozitjaiket esetleg ki kell cserélni, mivel az eljárás során csak a természetes fogak fogják visszafehéríteni.
A fővédő eszközöket, vagy kaptafett restaurációt igénylő páciensekről a szín stabilizálódása érdekében várjon két hetet a legutóbbi fehérítési kezelés után. Minden helyreállítással kapcsolatos zselét, vagy jól kezelhető ideglenes anyagok alkalmazásával.
A kezelés előtt 2 héttel, és a kezelés után még 2 hétig javasoljuk egy érzékeny fogakra való termék használatát.
Mindig figyelmeztesse a pácienst, hogy a kezelés során fogérzékenység, vagy ínyirritáció jelentkezhet. Az ínyek az a rész, mely a fogfehérítővel érintkező beprecsolhat, vagy elfehéredhet, de néhány nap után visszatér az ín eredeti színe.
A légyszövet irritációjának megelőzése érdekében tanácsolja páciensének, hogy ne töltse túl az egyetlen-kanalat. Illetve töltse le az ín szélén lévő fölösleges zselét, és a kezelés után jól öblítse ki a szájat.
Figyelmeztesse a pácienst, hogy a feszkendőtubus zárókupakját minden kezelés után zárja vissza.
A páciens a kezelés után legalább 60 percig nem evhet, nem ihat, és nem dohányozhat.
Figyelmeztesse a pácienst, hogy azonnal hagyja abba a kezelést és keresse meg Önt, ha bármilyen kellemetlen érzése lesz.
Kövesse szigorúan a 3D: 2 héttel a kezelés megkezdése után jelentkezı.

FIGYELMEZTETÉSEK
Fluoridot tartalmaz.
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
Kerülje az anyag szembe jutását.
Tartsa gyermekektől távol.
Érzékeny fogak esetén ne használja.
A mérésre szóbeli, fogfehérítővel megtöltött egyéni-kanál viselése közben re egyen, és ne dohányozzon.
Az anyag lenyelése veszélyes.

USZTÁTSOK ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ESETÉN
Ha az anyag jelentős részét (a feszkendőben lévő zselé több mint 25%-át) lenyelt: azonnal igyon vizet, és hányásra ne kínozza önöket.
Ha szembe kerül a zselé: húzza szét a szemhéjakat, és alaposan mossa ki a szemet legalább 15 percen át lágy vízzel, majd forduljon szemorvoshoz.
Ruhával, bőrrel, vagy hajjal való érintkezés esetén: vesse le a beszennyezett ruhát, és a bőrt, vagy a hajat folyó vízben öblítse le.

ESETLEGES KÁROS HATÁSOK
A Cavex Bite&White fogfehérítő zselé használata során az alábbi (de nem kizárólagos) káros mellékhatások jelentkezhetnek:

Érzékenység
Egyes páciensekénél a kezelés során a fogak hidegre történő fokozott érzékenysége jelentkezhet, mely másoknál a fogak, az ín, a nyelv, az ajkak és a szem általános (nem specifikus) érzékenysége fordulhat elő.
A fokozott általában a kezelés befejezése után néhány napon belül elmúlnak. A fogfehérítést rövidebb és ritkább gyakorisággal kezdjenek alkalmazásával folytatni lehet, amíg a kívánt fehérítési hatást el nem ért. Ha az érzékenység nem múlik, akkor a kezelést abba kell hagyni!

Az ín irritációja
Ha a fogfehérítőket használt egyéni-kanál, hozzák az ínyhez, akkor a légyszövet különböző erősségű irritációja fordulhat elő.
Ha az egyéni-kanál pontosan illeszkedik – de az irritáció fennáll -, akkor ellenőrizze, hogy a páciens a fehérítő zselét megfelelő mozgon és megfelelő mennyiségben alkalmazza-e.
Előfordulhat, hogy a páciensnek csökkentenie kell az egyéni-kanálba kitett zselé mennyiségét.

TÁROLÁSI TANÁCSOK
Tartsa a hűtőszekrényben (8ºC állatt), száraz, sötét helyen.
A szavatossági idő lejárta után már ne használja a fogfehérítőt.

HULLADÉK KEZELÉS
A helyi hulladékfeldolgozási előírásoknak megfelelően dobja el a termék hulladékát.

(PL) Instrukcja

OPIS
Nadtlenek wodoru to czynnik wybielający w Cavex Bite&White. Jest dodawany jako nadtlenek karbamidu, co zapewnia odpowiednią stabilność produktu. Nadtlenek karbamidu ulega rozpadowi na wodnikach tlenowych i wodzie. W trakcie procesu wybielania wolne rodniki atakują podwójne związki węgla; to właśnie one stanowią atacam za łagodzie cząstki barwnika.

OPAKOWANIE
■ Cavex Bite&White strzykawka (3 ml)

SKŁAD
Aktywne składniki:
16 % nadtlenek karbamidu – odpowiada
6 % nadtlenku wodoru
0,2 % azotan potasu-desensybilizator
0,1 % fluorku sodu-desensybilizator

WSKAZANIA DO UŻYCIA
Cavex Bite&White to produkt do wybielania zębów służący do rozjaśniania koloru naturalnych zębów. Cavex Bite&White można być wydawany wyłącznie przez stomatologa lub na jego zalecenie osobom w wieku powyżej 18 lat. Aby wykluczyć obecność zębów z zdrowym ząbu jamą ustną przed kądrym wybielaniem zalecane jest umówienie się na konsultację z wykwalifikowanym dentystą albo higienistą jamy ustnej.

PRZECIWWSKAZANIA
Poniższym osobom zaleca się zasięgnąć porady lekarskiej przed przystąpieniem do wybielania:
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
Osoby z przewlekłe choroby.

PROCEDURA KLINICZNA
Należy ustalić kolor zęby wyjściowy, ocenić bieżący stan zdrowia uzębienia i zadbać o to, by oczekiwania pacjenta w stosunku do efektów były realistyczne.
Wypełnienia typu fleczer może ulec przebarwieniu w trakcie procesu wybielania, w chwili gdy nie ma on żadnego wpływu na materiał kompozytowy lub polimeryzowany. W związku z tym należy poinformować pacjentów z złomitami z materiałów kompozytowych, że istnieje wzgorzy pozostały zostać wymienione, biorąc pod uwagę fakt, że tylko zęby naturalne staną się bielsze.
Przywrócenie koloru zębom sztucznym za zabiegi estetyczne lub z zastosowaniem spoiwa, należy odczekać 2 tygodnie od ostatniego zabiegu wybielania. Należy również poinformować pacjentów, że wybielanie nie powinno zostać nieprawidłowe lub dobrze zabezpieczone odpowiednim materiałem tymczasowym.
Zaleca się stosowanie produktu wrażliwych, na 2 tygodnie przed zabiegiem i 2 tygodnie po zabiegu.
Należy zawsze ostrzec pacjenta przed wrażliwością zębów oraz podrażnieniem dziąseł w trakcie zabiegu. Dziąsła, które mają słuchowość z produktem, mogą stać się czerwone lub białe, ale po kilku dniach ich naturalny kolor powróci.
Aby zapobiec podrażnieniu ikurnki miękkiej należy poinformować pacjenta, aby nie nakładał zbyt dużo zelu na łyżeczkę. Jego nadmiar usunąć przy użyciu chusteczki lub ręcznika papierowego.
Należy zwrócić uwagę pacjentowi, aby natychmiast wstrzymał zabieg jeśli wystąpi:
Ostry ból zębów
Ostre zimne
Ostateczny kolor pojawi się na około 2 tygodnie od chwili rozpoczęcia zabiegu.

OSTRZEŻENIA
Zawiera fluorek.
Zawiera nadtlenek wodoru.
Unikać kontaktu z oczami.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwych zębów.
Nie spożywać posiłków, napojów, ani nie palić w trakcie noszenia wypełnionej podstawki.
Produkt niebezpieczny w przypadku połknięcia.

PIERWSZA POMOC
W przypadku połknięcia dużej ilości produktu (więcej niż 25% żelu w strzykawce): należy natychmiast wypłukać usta wodą (co powodować wymioty) i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami: należy otworzyć szeroko powieki, płukać oczy przez przynajmniej 15 minut wodą i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą lub włosami: należy zdjąć skażone ubranie, a skórę lub włosy opłukać pod bieżącą wodą.

MOŻLIWE EFEKTY UBOCZNE
Efektami ubocznymi związanymi ze stosowaniem Cavex Bite&White to między innymi:

Wrażliwość
Niektórzy pacjenci w trakcie zabiegu mogą doświadczać nadmierną wrażliwości zębów na zimno, inne osoby mogą skarżyć się na nadwrażliwość zębów, dziąseł, języka, ust lub gardła.
Ogólne wzsrokie objawy powinny ustąpić na kilka dni po zakończeniu zabiegu. Zabieg można kontynuować w mniejszej częstotliwości, z mniejszą częstotliwością aż do osiągnięcia pożądanego efektu wybielania. Jeśli nieprzyjemne uczucie będzie się utrzymywać, należy zakończyć zabieg.

Podrażnienie dziąseł
Podstawki, które wystają do wysokości dziąseł, mogą powodować umiarkowane lub silne podrażnienie tkanki miękkiej.
Jeśli podstawki są obrzoe dopasowane, należy sprawdzić czy pacjent zastosowad odpowiednią ilość produktu.
Być może pacjent powinien zmniejszyć ilość żelu w podstawce.

ZALECANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w lodówce (+8°C) w ciemnym, suchym miejscu.
Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

UTYLIZACJA
Usunąć produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

(P) Instruções de utilização

DESCRIÇÃO
O peróxido de hidrogénio é o agente de clareamento utilizado no Cavex Bite&White. É adicionado como peróxido de carbamida para que se obtenha um produto suficientemente estável. O peróxido de carbamida decompõe-se naturalmente em radicais de oxigénio e água. Durante o processo de clareamento, os radicais livres atacam as ligações duplas de carbono que são a fonte da maioria das colorações (manchas) dentárias.

EMBALAGEM
■ Cavex Bite&White em seringas de 3 ml

COMPOSIÇÃO
Ingredientes ativos:
16% de peróxido de carbamida – equivalente a 6 % de peróxido de hidrogénio
0,2% de agentes dessensibilizantes à base de nitrato de potássio
0,1% de agentes dessensibilizantes à base de fluoreto de sódio

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Cavex Bite&White é um produto de clareamento dentário utilizado na diminuição da coloração de dentes naturais. O Cavex Bite&White só deve ser administrado mediante indicação ou por um profissional de odontologia a pessoas com mais de 18 anos. Antes de qualquer procedimento de clareamento, recomenda-se a consulta de um dentista qualificado para assegurar que não existem problemas de saúde ou oral subjacentes.

CONTRA-INDICAÇÕES
Antes do tratamento, as seguintes pessoas devem consultar um médico:
Mulheres grávidas ou a amamentar
Pessoas com doenças graves

PROCEDIMENTO CLÍNICO
Registre a cor inicial, verifique a saúde dentária atual e certifique-se de que o paciente tem expectativas realistas quanto aos resultados finais.As restaurações temporárias ou provisórias podem sofrer descoloração durante o processo de clareamento, ao passo que materiais em policarbonato ou compósitos não sofrerão qualquer alteração. Assim, os pacientes com restaurações em compósito devem ser informados de que só depois de clareamento poderão providenciar a substituição, uma vez que apenas os dentes naturais irão ser clareados.
Para pacientes que necessitem de restaurações adesivas ou estéticas, aguarde 2 semanas após o clareamento. Isto permitirá que o clareamento para permitir a estabilização da cor. Todas as restaurações devem estar intactas ou bem seladas com os materiais temporários adequados.
Deve ser recomendada a utilização de um dentífrico para alívio da sensibilidade dentária 2 semanas antes do tratamento e até 2 semanas após o mesmo.
Os pacientes devem ser informados da possibilidade de ocorrência de sensibilidade dentária ou irritação das gengivas durante o tratamento. As áreas da gengiva que entrem em contato com o produto podem ficar vermelhas ou brancas mas normalmente o normal após alguns dias.
Para evitar a irritação dos tecidos moles, aconselhe o paciente a evitar encher as moldeiras em demasia, a limpar quaisquer excessos de gel da linha das gengivas e a enxaguar a boca após o tratamento.
Após cada tratamento, certifique-se de que o paciente volta a colocar a tampa da seringa.
O paciente não deve comer, beber ou fumar durante, pelo menos, 60 minutos após cada tratamento.
Informe o paciente de que deve parar o tratamento e contatá-lo imediatamente se algum dos sintomas que descreve ocorrer.
A cor final será atingida cerca de 2 semanas após o início do tratamento.

ADVERTÊNCIAS
Contém fluoreto.
Contém peróxido de hidrogénio.
Evitar o contacto com os olhos.
Manter fora do alcance das crianças.
Evitar a exposição a pessoas com hipersensibilidade conhecida.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização das moldeiras.
Nocivo se ingerido.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
Em caso de ingestão de uma grande quantidade (mais de 25% do gel na seringa), beba imediatamente água, induza o vómito e contate um médico.
Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água corrente, durante, pelo menos, 15 minutos e contate ou consulte um oftalmologista.
Em caso de contato com as roupas, pele ou cabelo, retire a roupa contaminada e lave a pele ou cabelo com água corrente.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS
Os efeitos que podem estar relacionados com a utilização de Cavex Bite&White incluem, mas não estão limitados a:

Sensibilidade
Alguns pacientes podem sentir maior sensibilidade dentária ao frio durante o tratamento, enquanto outros podem sentir sensibilidade não especificada nos dentes, gengivas, língua, lábios ou garganta.
Em geral, os sintomas devem desaparecer alguns dias após o fim do tratamento.
O tratamento pode prosseguir, com aplicações mais curtas e menos frequentes, até ser conseguido o efeito de clareamento pretendido. Se a sensação de desconforto persistir, interrompa o tratamento.

Irritação das gengivas
As moldeiras que sextenderem até à gengiva podem provocar irritação ligeira a grave dos tecidos moles.
Se as moldeiras encaixarem corretamente, verifique se o paciente aplica a quantidade adequada da forma correta.
Poderá ser necessário que o paciente reduza a quantidade de gel nas moldeiras.

CONSELHOS DE ARMAZENAMENTO
Guardar em frigorífico (+8°C) num local seco, afastado da luz.
Não utilizar o material após a data de vencimento.

ELIMINAÇÃO
Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos locais para eliminação de resíduos.

(S) Bruksanvisning

BESKRIVNING
Vätesperoxid tjänar som blekningsmedel i Cavex Bite&White. Den tillsätts som karbamidperoxid för att ge en tillräckligt stabil produkt. Karbamidperoxiden upplöses naturligt till syreradikaler och vatten. Under blekningsprocessen attackerar de fria radikalerna de dubbla kolföreningarna; dessa utgör för det mesta orsaken till missfärgning av tänderna.

FÖRPACKNING
■ Cavex Bite&White sprutor (3 ml)

SAMMANSTÄLLNING
Aktiva ingredienser:
16 % karbamidperoxid – lika med 6 % väteperoxid
0,2 % halogenfri natriumnitrat
0,1 % natriumfluorid-desensitizer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
Cavex Bite&White är en blekningsprodukt för att göra naturliga tänder ljusare. Cavex Bite&White får endast tillhandahållas av eller på uppdrag av en tandläkare, till personer över 18 år. Ett besök hos en legitimerad tandläkare rekommenderas före varje bleknings, för att utesluta mun- eller hälsoproblem.

KONTRAINDIKATIONER
Följande personer rekommenderas att konsultera en läkare före behandlingen:
Gravida kvinnor och kvinnor som ammar
Personer som behandlas för en allvarlig sjukdom

KLINISK PROCEDUR
Fastställ utgångsfärgen, utvärdera tändernas nuvarande hälsa och se till att patientens förväntningar över slutresultatet är realistiska.
Provisoriska fyllningar eller fyllningar tandfärgningar kan missfärgning av det blekningsmedel som kompositbaserade eller polykarbonat material inte påverkas av blekningsmedlet. Man ska därför informera patienter med kompositfyllningar att befintliga kompositer möjligen bör bytas ut, eftersom endast naturliga tänder blir vitare.
Vänta 2 veckor efter den senaste blekningsprocedur innan patienten gå att färgen kan stabiliseras, då det gäller patienter som behöver en estetisk behandling eller en tandfärgning med bindemedel. Alla lagningar ska vara intakta och väl applicerade med de rätta tillfälliga materialen.
Det är tillrådligt att använda en produkt för känsliga tänder 2 veckor före och 2 veckor efter behandlingen.
Varna alltid patienten att det kan uppstå känslighet i tänderna eller irritation i tandkötet under behandlingen. Tandkötet som kommer i beröring med medlet kan bli rött eller vitt, men återtar efter några dagar sin normala färg.
Ge patienten råd om att inte fylla på för mycket gel i skenan för att undvika irritation av mjuk vävnad och att avlägsna överflödigt gel på gränsen till tandköttet och att skölja munnen ordentligt efter behandlingen.
Påpeka för patienten att skruva på locket på sprutan efter varje behandling.
Patienten bör inte äta eller dricka eller röka efter varje behandling under minst 60 minuter.
Instruera patienten att stoppa behandlingen och omedelbart kontakta er om det uppstår något problem.
Den slutliga färgen framträder ca. 2 veckor efter behandlingens början.

VARNINGAR
Innehåller fluorid.
Innehåller väteperoxid.
Undvik kontakt med ögonen.
Hålles utom räckhåll för barn.
Använd det inte vid överkänsliga tänder.
Under tiden du bär den anpassade skenan ska du inte äta, dricka eller röka.
Farligt att förtära.

INSTRUKTIONER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Om du svalt en stor mängd (mer än 25% av gelet i sprutan): drick genast vatten, framkalla inte kräkning och kontakta en läkare.
Om du får gel i ögonen: dra upp ögonlocken och skölj under minst 15 minuter med vatten och konsultera en läkare.
Vid kontakt med kläder, hud eller hår: avlägsna angripen klädsel och skölj hud eller hår under rinnande vatten.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR EFFEKTER
Skadliga effekter som kan sammanhänga med användningen av Cavex Bite&White är bland andra men inte uteslutande:

Känslighet
Vissa patienter kan under behandlingen uppleva en tillfälligande känslighet för kyla i tänderna; andra kan uppleva en obestämd känslighet i tänder, tandkött, tunga, läppar eller strupen.
I allmänhet ska symptomen upphöra några dagar efter behandlingens slut. Behandlingen kan fortsätta med kortare behandlingstider och längre tids gap tills den önskade blekningseffekten har uppnåtts. Om besväret förblir bör behandlingen avbrytas.

Irritation av tandköttet
Skenor som räcker upp till tandköttet kan ge en mättlig till allvarlig irritation av mjuk vävnad.
Om skenorna passar bra, kontrollera då om patienten använder rätt mängd på rätt sätt. Det är möjligt att patienten bör minska mängden gel i skenorna.

FÖRVARING
Förvara i kylskåp (+8°C) på en mörk, tor plats.
Använd inte materialet efter bäst/fördatum.

AVFALL
Avlägsna produkten i överensstämmelse med lokala avfallsregler.

(TR) Kullanım kılavuzu

AÇIKLAMA
Cavex Bite&White ürününde beyazlatıcı olarak hidrojen peroksit kullanılmaktadır. Yeterince kararlı bir ürün elde etmek için karbamit peroksit ilavesi edilmiştir. Karbamit peroksit, sudan ve oksijenden oluşan serbest oksijen radikallerine ayrılır. Beyazlatma esnasında serbest radikaller, dişteki renklenmenin kaynağı olan ikili karbon bağlarına saldırır.

AMBALAJ
■ Cavex Bite&White şırıngalar (3 ml)

FORMÜLÜ
Muhteviyat:
16 % karbamit peroksit – %6 hidrojen peroksite eşittir.
0,2 % hassasiyet giderici potasyum nitrat
0,1 % hassasiyet giderici sodyum flüorür

KULLANIM ENDİKASYONLARI
Cavex Bite&White doğal olan dişlerin rengini açmak için kullanılan bir beyazlatma ürünüdür. Cavex Bite&White, sadece diş hekimi tarafından veya onun talimatıyla 18 yaşından büyük kişiler tarafından kullanılmalıdır. Herhangi bir beyazatlama işleminden önce, ağız ve diş genel sağlığınızla ilgili sorunları engellemek için yetkili diş hekimine muayene olunması tavsiye edilir.

KONTRENDİKASYONLARI
Aşağıda kişilere işlemden önce bir doktora danışılmaları tavsiye edilir:
Hamile bayanlar ve emziren anneler.
Ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gören kişiler

KLİNİK PROSEDÜR
Başlangıç rengini kayıt altına alın. Mevcut diş sağlığını inceleyin. Ayrıca hedeflenen tonlara ilişkin hastalarda hasta beklentilerini gerçeği olduğundan emin olun.
Kompozit veya polikarbonat materyalleri etkilenmeden ayrıen kalırken, geçici restorasyonlar beyazlatma işlemi sırasında renk değiştirebilir. Bu sebeten mülayen bir bitya ut, ellerson endast naturliga tänder blir vitare.
Vänta 2 veckor efter den senaste blekningsproceduren innan patienten går att färgen kan stabiliseras, då det gäller patienter som behöver en estetisk behandling eller en tandfärgning med bindemedel. Alla lagningar ska vara intakta och väl applicerade med de rätta tillfälliga materialen.
Det är tillrådligt att använda en produkt för känsliga tänder 2 veckor före och 2 veckor efter behandlingen.
Varna alltid patienten att det kan uppstå känslighet i tänderna eller irritation i tandkötet under behandlingen. Tandkötet som kommer i beröring med medlet kan bli rött eller vitt, men återtar efter några dagar sin normala färg.
Ge patienten råd om att inte fylla på för mycket gel i skenan för att undvika irritation av mjuk vävnad och att avlägsna överflödigt gel på gränsen till tandköttet och att skölja munnen ordentligt efter behandlingen.
Påpeka för patienten att skruva på locket på sprutan efter varje behandling.
Patienten bör inte äta eller dricka eller röka efter varje behandling under minst 60 minuter.
Instruera patienten att stoppa behandlingen och omedelbart kontakta er om det uppstår något problem.
Den slutliga färgen framträder ca. 2 veckor efter behandlingens början.

VARNINGAR
Innehåller fluorid.
Innehåller väteperoxid.
Undvik kontakt med ögonen.
Hålles utom räckhåll för barn.
Använd det inte vid överkänsliga tänder.
Under tiden du bär den anpassade skenan ska du inte äta, dricka eller röka.
Farligt att förtära.

İLK YARDIM TALİMATLARI
Şırınganın içerisindeki jelin ¼'inden fazlasının yutulması durumunda derhal su içtirerek, zorla kusturmayın ve bir doktora başvurun.
Jelin göz ile temasa durumunda gözkapaklarını açıp gözü en az 15 dakika boyunca su ile yıkamak ve bir hekime danışmak gerekir.
Elbise ve cilt ile temasa durumunda kontamine bulaşıkları, kıyafetinizi çıkartın, teninizi yada saçınızı suyun altına tutun.

OLUŞABİLECEK OLUMSUZ ETKİLER
Cavex Bite&White kullanımıyla ilgili olarak oluşabilecek olumsuz etkiler aşağıda belirtilmiştir, ancak aşağıda belirtilmemiş etkiler oluşabilir:

Hassasiyet
Bazı hastalar tedavi esnasında dişlerinde soğuğa karşı aşırı hassasiyet hissedebilirler. Diğerlerinde ise dişlerde, dişetlerinde, dilde, dudaklarda veya boğazda hassasiyet görülebilir. Genellikle bu tür hassasiyetler tedavi bitiminden sonra birkaç gün içerisinde kaybolur. Hedeflenen beyazlığa ulaşılana kadar tedaviye seans sayısını düşürerek ve seans aralıklarını artırarak devam edilebilir. Şikayetler devam ederse, tedaviyi sonlandırmak gerekir.

Dişetlerinde tahriş
Oluçı kaşıkları dişetlerine kadar ulaşırsa, yumuşak dokuda hafif ya da ciddi tahriş oluşabilir.
Şayet diçi kaşıkları dişetlerine tam oturuyorsa, hastanın doğru miktarda ürünü doğru yolla uyguladığını uygulamadığını kontrol ediniz. Hastanın diçi kaşığındaki jel miktarını azaltması gerekebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI
Buzdolabında (+8°C) ışıktan korunyarak kuru yerde muhafaza edin.
Son kullanma tarihi geçen ürünü kullanmayın.

İMHA
Ürünü yerel atık yönetmeliklerine göre imha edinsiz.

(GR) Οδηγίες χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο λευκαντικός παράγοντας στο Cavex Bite&White είναι το υπεροξείδιο υδρογόνου. Προσθέτεται ως υπεροξείδιο καρβαμίδιου για την επίτευξη ενός επαρκώς σταθερού προϊόντος. Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου διασπάται φυσικά σε ρίζες οξυγόνου και νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, οι ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τις διπλοδεσμικές ενώσεις, οι οποίες είναι συνήθως υπεύθυνες για τον αποχρωματισμό των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
■ Σύριγγες Cavex Bite&White 3 ml

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενεργά συστατικά:
16 % υπεροξείδιο καρβαμιδίου – ισοδύναμο με 6 % υπεροξείδιο υδρογόνου
0,2 % απευαισθητοποιητής νιτρικού καλίου
0,1 % απευαισθητοποιητής φθορούχου νατρίου

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Cavex Bite&White είναι ένα λευκαντικό προϊόν για τη λεύκανση των φυσικών δοντιών. Το Cavex Bite&White πρέπει να χορηγείται μόνο από οδοντίατρο ή με δική του εντολή σε άτομα άνω των 18 ετών. Πριν από κάθε διαδικασία λεύκανσης συνιστάται να επισκέπτεστε ένα δπλωματούχο οδοντίατρο έτσι ώστε να προσδιορίσει και είτε να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα στο στόμα ή προβλήματα υγείας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πριν την έκχυση συνιστάται στα παρακάτω άτομα να συμβουλεύονται γιατρό:
Έγκυες και θηλαζούσες
Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για σοβαρή ασθένεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Καθορίστε το χρώμα εκκίνησης, εκτιμήστε την τωρινή υγεία της οδοντοστοιχίας και φροντίστε τα ασθενή να έχουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα.
Προσωρινά ή παλαιά υλικά πλήρωσης ή πορσελάνες του οδοντικού μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, ενώ συνθέτη ή πολυκαρβονικά υλικά δεν επηρεάζονται. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς με σύνθετες αποκαταστάσεις ότι το υπάρχοντα σύνθετα υλικά ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν, δεδομένου ότι μόνο τα φυσικά δόντια μπορούν να λευκάνουν.
Τοποθετήστε ξηδικά σφραγίσματα για να 2 hafta sonrasına kadar devam etmek suretiyle hastaya hassas dişler için bir ürünü kullanmanız gerektiğini tavsiye edilecektir.
Ενημερώστε τους ασθενείς ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να εμφανιστούν ούλα και/ή τα δόντια τους την ευαισθησία. Το ούλο που έρχεται σε επαφή με το υλικό μπορεί να γίνει κόκκινο ή λευκό, αλλά ανακτά το φυσιολογικό χρώμα μετά από μερικές ημέρες.
Συμβουλέψτε τον ασθενή - προς πρόληψη ερεθισμού του μαλακού ιστού - να μη γεμίζει υπερβολικά το δίσκο λεύκανσης, να αφαιρεί το τζελ που έρχεται σε επαφή με τα ούλα και στη συνέχεια να ξεπλένει το στόμα του μετά τη διαδικασία.
Επισημάνετε στον ασθενή ότι, μετά από κάθε διαδικασία, πρέπει να επανατοποθετεί το κοπάκι της σύριγγας.
Ο ασθενής δεν επιτρέπεται να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει για τα επόμενα 60 λεπτά τουλάχιστον μετά από κάθε εφαρμογή.
Πείτε στον ασθενή να σταματήσει τη θεραπεία και να έρθει αμέσως σε επαφή μαζί σας εάν παρουσιαστεί κάτι προβλημα.
Το τελικό χρώμα επιτυγχάνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Περιέχει φθορούχο άλας
Περιέχει υπεροξείδιο υδρογόνου.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
Να το κρατάτε μακριά από τα παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε σε υπερευαίσθητα δόντια.
Μη τρώτε, μη πίνετε και μη καπνίζετε ενόσω φοράτε τα νάρθηκα στομικά διαλύεται.
Επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Αν καταπιείτε μια μεγάλη ποσότητα (περισσότερο από 25% του ηζλ στη σύριγγα): πιείτε αμέσως νερό, μην προκαλείτε εμετό και καλέστε έναν συμβουλευτικό ειδικό για γιατρό.
Εάν τυχόν τζλ στα μάτια: κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα, ξεπλύνετε το μάτι με νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον χωρίς διακοπή και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με ρούχα, επιδερμίδα ή μαλλιά: αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν επιμολυνθεί και ξεπλύνετε την επιδερμίδα ή τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του Cavex Bite&White είναι μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

Ευαισθησία
Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να έχουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας μια αυξημένη ευαισθησία των δοντιών στο κρύο. Άλλοι ενδέχεται να έχουν μια απροσδιόριστη ευαισθησία στα δόντια, τα ούλα, τη γλώσσα, τα χείλη ή το λαιμό. Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να υποχωρήσουν μερικές μέρες μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με συντομότερες, λιγότερο συχνές δοσολογίες, εως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα λεύκανσης. Εάν η ενόχληση παραμένει, πρέπει να τεθεί τέρμα στη θεραπεία.

Ερεθισμός των ούλων
Δίσκοι που εκτείνονται μέχρι το ούλα μπορούν να προκαλέσουν ένα μέτριο μέχρι σοβαρό ερεθισμό του μαλακού ιστού.
Εάν τα δίσκοια εφαρμόζουν καλά, ελέγξτε αν ο ασθενής χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα με τον σωστό τρόπο.
Ενδέχεται να πρέπει να μειώσει ο ασθενής την ποσότητα τζλ στα δίσκοια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΦΥΛΑΞΗΣ
Να το φυλάσσετε στο ψυγείο (+8°C) σε σκοτεινό και στεγνό μέρος.
Μη χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την ημερομηνία λήξης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Να απορρίπτεται το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για απορρίμματα.

(RUS) Инструкция по применению

ОПИСАНИЕ
В составе средства компании Cavex под названием "Bite&White" перекись водорода играет роль отбеливателя. Это вещество добавлено в виде перекиси карбамида с целью обеспечения стабильности продукта. Перекись карбамида быстро разлагается в радикалы кислорода и воды. Во время процесса отбеливания свободные радикалы атакуют сопряженные этиленовые связи, которые являются основной причиной изменения цвета зубной эмали.

УПАКОВКА
■ Шприцы Cavex Bite&White (3 мл)

СОСТАВ
Активные вещества:
16 % перекись карбамида – соответствует 6 % перекиси водорода
0,2 % десенсибилизатора азотного калия
0,1 % десенсибилизатора фторида натрия

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Cavex Bite&White – отбеливающее средство, применяемое для осветления цвета зубов. Лицам моложе 18 лет Cavex Bite&White должен назначать только стоматологом или по его поручению. Рекомендуется перед каждым сеансом отбеливания консультироваться с стоматологом, чтобы исключить проблемы полости рта или общего здоровья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В указанных ниже случаях перед применением средства требуется получить консультацию врача:
Беременность, грудное вскармливание
Проходящие лечение от серьезного заболевания.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Зафиксируйте первоначальный цвет зубов, оцените состояние зубов и полости рта и проконтролируйте, чтобы ожидания пациента в отношении окончательного результата.
Временные элементы реставрации могут изменить свой цвет в процессе отбеливания, в то время как гелеокомпозитные или полимеризованные материалы не изменят. В связи с этим пациентам с гелеокомпозитными элементами реставрации необходимо указать на возможность замены существующих композиционных материалов, в виду того, что они, в отличие от естественных зубов, не поддаются отбеливанию.
Если пациент нуждается в эстетической или цементирующей реставрации, осуществляйте ее не ранее, чем через две недели после отбеливания. Это позволит окончательно стабилизировать цвет зубов. За это время новый цвет сможет стабилизироваться. Все виды реставрации зубов не должны иметь никаких повре